

6
Zur Lehre von der Wendung auf die Füße bei
engem Becken.

Inaugural - Dissertation

welche mit Genehmigung

der

medizinischen Facultät hiesiger Universität

zur Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin und Chirurgie

Sonnabend, den 27. April 1872, Mittags 12 Uhr

in der Aula Leopoldina

öffentlich vertheidigen wird

Simon Borinski.

Opponenten:

J. Eger, Dr. med.,

P. Scholz, Cand. med.

~~~~~  
**Breslau.**

**F. W. Jungfer's Buchdruckerei.**

1872.

DISSERTATIONS COLLECTION

History and Special Collections Division  
Biomedical Library, UCLA

Seinem hochverehrten Lehrer

dem

Herrn Medicinalrath

**Professor Dr. O. Spiegelberg**

Ritter etc.

aus Dankbarkeit und Ehrerbietung

gewidmet

**vom Verfasser**



Unter den verschiedenen Behandlungsweisen, welche bei Geburten mit Beckenenge je nach den vorliegenden Verhältnissen in Frage kommen, ist es besonders die Wendung auf die Füße, deren Anzeige trotz vielfacher Bemühungen bisher noch nicht mit allseitiger Uebereinstimmung festgestellt werden konnte. Dass gewisse Anomalien des Geburtsverlaufes, wie absolut ungünstige Fruchtlage, gefahrdrohende Symptome von Seiten der Mutter oder der Frucht, sowie beim normal gebauten so auch beim verengten Becken die Wendung, wenn nur die Vorbedingungen erfüllt sind, unabweislich machen, darüber herrscht in der Gegenwart wohl nur Eine Stimme. Dagegen lauten die Urtheile der Autoren sehr getheilt, wenn der Werth der Wendung als einer „vorbauenden“ Operation, um bei Schädelgeburten mit zögernder Einstellung des Kopfes den nach Oeffnung des Muttermundes drohenden Gefahren für Mutter und Kind vorzubeugen, zur Sprache kommt.

Die Gegner der Wendung — es ist dies die Mehrzahl der neueren Geburtshelfer — halten das Leben der Frucht bei Geburt mit nachfolgendem Kopfe für ausserordentlich gefährdet gegenüber der lebenserhaltenden Configurationsfähigkeit des vorangehenden Schädels, berufen sich auf die bekannte Erfahrung, dass Geburten in Beckenendelage schon bei normalen Becken, umsomehr bei räumlichem Missverhältniss für die Erhaltung des Kindes eine schlechte Prognose bieten, und verweisen im Besonderen auf die Resultate der Wendungsstatistik älteren und neueren Datums.

Die Anhänger der Wendung gestehen der Schädelgeburt bei vorhandenem räumlichem Missverhältniss für gewisse Beckengattungen diese Vorzüge nicht zu, erklären die ungünstigen Ergebnisse der älteren Statistik durch die damaligen ungeeigneten Extraktionsmethoden sowie durch zu spätes Operiren, rühmen die eclatanten Erfolge, welche Schroeder, Hoening, Scharlau, Strassmann in neuerer Zeit veröffentlicht haben, betonen die Gefahren protrahirter Geburten für Mutter und Kind und empfehlen die Wendung ganz besonders in Rücksicht auf erstere. Als Beweis für den leichteren Durchtritt des nachfolgenden Kopfes wird u. A. die Beobachtung Hoening's (Mon. f. Geb. B. XXXIII, S. 255) angeführt, wonach bei derselben Frau mehrere Schädelgeburten mit tödtlichen Verletzungen der Frucht verliefen, während späterhin Fusslagen trotz grösserer Kopfmasse einen glücklichen Ausgang hatten.

Wenn es auch stets einzelne Fälle geben wird, welche den Allgemeinregeln spottend ihre individuelle Behandlung erfordern, so liesse sich doch im Prinzip die Sache zum Austrag bringen, wenn zahlreiche, genaue ergiebige Beobachtungen die Chancen für das eine oder andere Verfahren feststellten.

Als einen dahin gehörigen Beitrag möge man die in den folgenden Blättern verzeichneten Fälle von Wendung und Extraction bei engem Becken ansehen, welche vom Herbste 1865 ab, seitdem Herr Medicinalrath Prof. Dr. Spiegelberg das geburtshülfliche Institut zu Breslau dirigirt, in hiesiger Klinik und Poliklinik vorgekommen sind. Anstatt eine fortlaufende Reihe von Geburtsgeschichten, welche doch viel Unwesentliches bringen und die Uebersicht erschweren würden, zu liefern, habe ich es vorgezogen, die zur Entscheidung unserer Frage wichtigsten Factoren, soweit die vorhandenen Daten reichen, herauszuheben und von einem natürlichen Gesichtspunkte aus in Rubriken zu ordnen.



# I. Kopflagen

| Num-<br>mer.                                             | Name<br>und<br>Alter.          | Anamnese                                           | Becken.                                                                                                                  | Kind.                                                                                               | Kopfstellung.                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b><br><br>Klin.<br><sup>66</sup> / <sub>67</sub>  | Rosina<br>W.<br>26 J.          | 2. Entb.<br>1. durch<br>Zange.                     | Platt.<br>Cv. = 3'' 3''' = 8,7 cm.<br>Prom. hoch, vordere<br>Beckenw. hoch u.<br>steil.                                  | Mädchen.<br>Gew. 6 Pfd. 5 L.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 10,0                              | 1. Schädellage,<br>Sut. Sag. dicht über<br>der Symph., Kopf<br>ziemlich fest auf Ein-<br>gang, linke Becken-<br>hälfte leer. |
| <b>2.</b><br><br>Klin.<br><sup>67</sup> / <sub>68</sub>  | Caro-<br>line S.<br>27 J.      | 3. Entb.,<br>sonst nor-<br>mal.                    | Platt, nicht rha-<br>chitisch.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.<br>Prom. niedrig, vord.<br>Beckenw. niedrig,<br>gut geneigt.  | Mädchen.<br>Gew. 6 Pfd. 20 L.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 36,0<br>Qu. = 9,5                              | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>voll im Eingang,<br>etwas beweglich.                              |
| <b>3.</b><br><br>Pol.<br><sup>21</sup> / <sub>2</sub> 70 | Caro-<br>line<br>Sch.<br>23 J. | 5. Entb.                                           | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.<br>Prom. tief, stark vor-<br>ragend, vord.<br>Beckenw. steil u.<br>hoch. | Knabe,<br>kräftig.<br>Kopf sehr<br>gross.                                                           | 2. Ohrlage.<br>Feilnaht dicht über<br>der Schamfuge.                                                                         |
| <b>4.</b><br><br>Pol.<br><sup>67</sup> / <sub>68</sub>   | Marie<br>W.<br>41 J.           | 4. Entb.,<br>sonst<br>lang-<br>dauernd,<br>normal. | Platt.<br>Cv. = 3'' 1''' = 8,3 cm.                                                                                       | Knabe.<br>Gew. 8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Pfd.<br>K. = 38,0<br>Sch. = 42,0                       | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>nahe dem Prom.,<br>Kopf auf Eingang<br>beweglich.            |
| <b>5.</b><br><br>Pol.<br><sup>66</sup> / <sub>67</sub>   | Rosina<br>R.<br>28 J.          | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>Kind todt.    | Platt.<br>Cv. = 3'' = 8,1 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                                      | Knabe<br>von normaler<br>Grösse. Kopf-<br>knochen fest.<br>K. (nach Perf.)<br>= 35,0<br>Sch. = 36,0 | 1. Schädellage.<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>näher dem Prom.,<br>Kopf auf Eingang<br>beweglich.           |

# ohne Complication.

| Indication.                                                        | Geburts-<br>dauer.      | Blasen-<br>sprung.          | Verlauf.                                                                                                                                                          | Ausgang<br>für                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                    |                         |                             |                                                                                                                                                                   | Mutter.                                                                       | Kind.                           |
| Dauernd ungünstige<br>Kopfstellung trotz<br>energischer Wehen.     | 21 Std.                 | vor 1 $\frac{1}{2}$<br>Std. | Wendg. u. Extr. ziem-<br>lich leicht und rasch<br>(10 Minuten), nur das<br>Prom. bietet grösseren<br>Widerstand. (Kind rei-<br>tet auf Nabelschnur.)              | normal.                                                                       | stirbt<br>asphyct.              |
| Docendi causa.                                                     | 3 $\frac{1}{4}$<br>Std. | vor<br>1 $\frac{1}{4}$ Std. | Wendg. u. Extr. leicht.                                                                                                                                           | normal.                                                                       | normal.                         |
| Ungünstige Kopf-<br>stellung.                                      | 38 Std.                 | eben<br>er-<br>folgt.       | Wendg. leicht. Wegen<br>Verlangsamung des Fö-<br>talpulses Extr.; sowohl<br>die des Rumpfes als die<br>des Kopfes durch Enge<br>des Eingangs sehr er-<br>schwert. | normal.                                                                       | stirbt<br>asphyct.              |
| Stillstand der Geburt<br>seit vielen Stunden<br>bei Wehenschwäche. | etwa<br>18 Std.         | vor<br>etwa<br>15 Std.      | Wendg. auf einen Fuss<br>und Extr. leicht.                                                                                                                        | normal.                                                                       | asphyct.,<br>wieder-<br>belebt. |
| Stillstand<br>der Geburt.                                          | 48 Std.                 | vor<br>18 Std.              | Wendg. auf beide Füße<br>sehr schwierig; Extr. des<br>Rumpfes leicht, Kopf<br>wird perfor.                                                                        | leichte<br>Endome-<br>tritis mit<br>Heilung.<br>Blasen-<br>Uterus-<br>Fistel. | perforirt.                      |

| Num-<br>mer.                 | Name<br>und<br>Alter.         | Anamnese                                                                     | Becken.                                                                                                                                      | Kind.                                                                                | Kopfstellung.                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b>                    | Erne-<br>stine<br>B.<br>33 J. | 6. Entb.,<br>1. u. 2. nor-<br>mal, 3. u. 4.<br>durch<br>Zange,<br>5. normal. | Platt.<br>Cv.=2''10'''=7,6cm.<br>D. Sp. = 24,0<br>D. Cr. = 24,0<br>Dopp. Prom., wahres<br>sehr hoch stehend.                                 | Knabe.<br>Gw. 7 Pfd. 18 L.<br>K. = 36,0<br>Sch. = 38,0<br>Qu. = 10,5                 | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>sehr nahe d. Symph.<br>Kopf beweglich auf<br>Eingang.                                                                           |
| Klin.<br><sup>66/67</sup>    |                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>7.</b>                    | Caro-<br>line<br>W.<br>27 J.  | 2. Entb.,<br>1. mittelst<br>Perf. des<br>voran-<br>gehenden<br>Kopfes.       | Platt.<br>Cv.=2''10'''=7,6cm.<br>Prom. sehr hoch<br>stehend.                                                                                 | Knabe,<br>sehr kräftig.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 35,0<br>Bip.Qu.=10,0<br>Bit. Qu.= 9,0 | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>beweglich auf<br>Eingang.                                                                                                            |
| Pol.<br><sup>22/12 66</sup>  |                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>8.</b>                    | Elisa-<br>beth<br>B.<br>27 J. | 2. Entb.,<br>1. normal,<br>sehr lang-<br>dauernd.                            | Platt.<br>Cv.=2''10'''=7,6cm.<br>D. Sp. = 21,0<br>D. Cr. = 23,0<br>Prom. tief stehend.                                                       | Knabe.<br>Gew. 5 1/2 Pfd.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 34,0                                | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>dicht über Symph.<br>nach rechts u. hinten<br>verlaufend, Kopf<br>sehr beweglich, mit<br>größtem Umfange<br>auf d. r. Darmbein. |
| Klin.<br><sup>22/12 66</sup> |                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>9.</b>                    | Julie<br>Sch.<br>32 J.        | 2. Entb.,<br>1. normal.                                                      | Platt, rhachitisch.<br>Cv.=2''9'''=7,5 cm.                                                                                                   | Knabe,<br>nicht kräftig.                                                             | 1. Schädellage,<br>Kopf etwas nach<br>rechts ausgewichen.                                                                                                                                       |
| Pol.<br><sup>9/7 68</sup>    |                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>10.</b>                   | Su-<br>sanne<br>Sch.<br>39 J. | 1. Entb.                                                                     | Platt.<br>Cv.=2''9'''=7,5 cm.<br>D. Sp. = 23,5<br>D. Cr. = 25,5<br>Prom. scharf vor-<br>springend, vord.<br>Beckenw. sehr steil<br>und hoch. | Mädchen.                                                                             | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>sehr nahe d. Symph.<br>Kopf hoch über dem<br>Eingang.                                                                           |
| Pol.<br><sup>24/9 68</sup>   |                               |                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 |

| Indication.                                                                                                                       | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.    | Verlauf.                                                                                                                                        | Ausgang<br>für |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                    |                       |                                                                                                                                                 | Mutter.        | Kind.                                                                                                                         |
| Unverändert ungünstige Kopfstellung.                                                                                              | 7½ Std.            | vor<br>3 Std.         | Wendg. nur auf beide Füsse leicht, Rumpf folgt spontan, Nabelschnurpuls sistirt, Kopf wird mit grosser Mühe durch den engen Eingang entwickelt. | normal.        | tief asph., mit Mühe wiederbel. Tiefe Impression d. l. Schläfengegend kl. Fract. am hint. Umfang d. r. Tub. par. Gesund entl. |
| Stillstand der Geburt seit mehreren Stunden, Hoffnung, ein lebendes Kind zu extrahiren, Rücksicht auf frühere schwere Entbindung. | etwa<br>18 Std.    | vor<br>15 Std.        | Wendg. auf beide Füsse und Extr. leicht.                                                                                                        | normal.        | leicht asph., wiederbelebt.                                                                                                   |
| Ungünstige Einstellung.                                                                                                           | 15 Std.            | Blase steht.          | Wendg. innerhalb der schlaffen Eihäute und Extr. erfolgt rasch (15 Minuten).                                                                    | normal.        | asphyct., rasch wiederbelebt.                                                                                                 |
| Trotz Sprengen der Fruchtblase bleibt der Kopf deviirt.                                                                           | etwa<br>10 Std.    | Blase eben gesprengt. | Wendg. auf beide Füsse leicht, Extr. des Kopfes mässig schwer.                                                                                  | normal.        | normal.                                                                                                                       |
| Dauernd ungünstige Kopfstellung bei Wehenschwäche.                                                                                | 31 Std.            | vor<br>20 Std.        | Wendg. auf einen Fuss, Extr. des Steisses schwierig, Kopf perforirt und mit Zange extrahirt.                                                    | normal.        | perforirt.                                                                                                                    |

Anmerkung. Zwei Jahre darauf wurde dieselbe Frau von einem sehr grossen lebenden Knaben mit vorausgehendem Schädel spontan entbunden.

| Num-mer.          | Name und Alter.      | Anamnese                                                                                             | Becken.                                                                                                                                                                         | Kind.                                                                                | Kopfstellung.                                                                                                                                        |                                                            |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 11.               | Caroline P.<br>28 J. | 6. Entb.,<br>1. u. 2. lang-<br>dauernd,<br>normal,<br>3. mittelst<br>Perfor.,<br>4. Früh-<br>geburt. | Platt, rhachitisch.<br>Cv.=2"8'''=7,25cm.<br>D.Sp.=8"8'''=23,5 „<br>D.Cr.=8"4'''=22,5 „<br>Dopp. Prom., wahres<br>sehr hoch, scharf<br>vorragend, vord.<br>Beckenw. sehr steil. | Knabe.<br>Gw.5Pfd.28L.<br>K. = 31,0<br>Sch. = 32,0<br>Qu. = 8,0                      | 2. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>d. Symph. genähert<br>Kopf beweglich auf<br>Eingang.                                 |                                                            |
| Klin.<br>69/70    | 12.                  | A. U.<br>30 J.                                                                                       | 3. Entb.,<br>1. Früh-<br>geburt,<br>leb. Kind.<br>2. Fuss-<br>lage mit<br>Perf. des<br>Kopfes.                                                                                  | Platt.<br>Cv.=2"8'''=7,25cm.<br>D. Sp. = 24,0<br>D. Cr. = 23,5<br>Prom. hochstehend. | Knabe.<br>Künstliche<br>Frühgeburt<br>von<br>36 Wochen.                                                                                              | 1. Gesichtslage,<br>Gesicht beweglich<br>über dem Eingang. |
| Pol.<br>7/1 67    | 13.                  | Ida G.<br>24 J.                                                                                      | 1. Entb.<br>Platt.<br>Cv.=2"6'''=6,75cm.<br>D. Sp. = 25,0<br>D. Cr. = 24,5<br>Prom. mittelhoch,<br>vord. Beckenw. hoch,<br>gut geneigt.                                         | Knabe.<br>Gw.6Pfd.21L.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 35,0<br>Qu. = 9,0                      | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>sehr nahe d. Symph.,<br>Hinterhaupt auf l.<br>Darmbein, rechte<br>Beckenhälfte leer. |                                                            |
| Klin.<br>9/1 68   | 14.                  | Jo-<br>hanna<br>E.<br>21 J.                                                                          | 1. Entb.<br>Platt, allgemein<br>verengt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>D. Sp. = 21,75<br>D. Cr. = 21,0<br>Prom. sehr tief, vord.<br>Beckenw. hoch u.<br>steil, Schambogen<br>eng.    | Knabe,<br>starkknochig.<br>Gew.6Pfd.8L.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 38,0<br>Qu. = 9,0     | 1. Schädellage,<br>hintereScheitelbein-<br>lage, Kopf sehr be-<br>weglich auf Ein-<br>gang.                                                          |                                                            |
| Klin.<br>80/11 71 |                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                            |

| Indication.                                                     | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                                                                       | Ausgang<br>für                                                          |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                | Mutter.                                                                 | Kind.                                                                                                                                        |
| Dauernd ungünstige Kopfstellung trotz energischer Wehen.        | 17 Std.            | vor 10 Std.        | Wendg. auf einen Fuss durch Uterus-Contraction erschwert, aber rasch, die heraufgeschlagenen Arme leicht gelöst, der Kopf nur mit äusserster Kraftanstrengung manuell entwickelt.                                              | normal.                                                                 | tief asph., mit Mühe wiederbelebt. Beträchtl. Nahtverschiebung tiefe Impressionen an d. l. Kopfseite. Tod nach 20 Tagen an Otit. blenn. sin. |
| Stillstand der Geburt seit mehreren Stunden bei Wehenschwäche.  | ?                  | vor 5 Std.         | Wendg. auf beide Füße und Extr. des Rumpfes leicht, Lösung der Arme verzögert, die Extr. des Kopfes wegen Beckenge schwierig.                                                                                                  | normal.                                                                 | stirbt asphyct.                                                                                                                              |
| Dauernd ungünstige Kopfstellung, Rücksicht auf Kind und Mutter. | 24 Std.            | vor 1/2 Std.       | Wendg. u. Extr. äusserst schwierig, sowohl wegen Enge des Eingangs, als auch wegen Contraction des Uterus. Nabelschnurpuls sistirt während der Operation.                                                                      | Scheiden-dammriss, Parametr., Metr. phlegm., Ichorrh. Tod nach 4 Tagen. | stirbt in partu. Tiefe Impressionen u. Infraction am Schädel entsprechend d. Symph. u. dem Prom.                                             |
| Langsamer Fortschritt der Geburt, ungünstige Kopfstellung.      | 37 Std.            | Blase steht.       | Sprengen der Blase, Wendg. wegen Uterus-Contraction schwer, gelingt nur auf beide Füße, Fötal puls sistirt, Extr. und Lösung der heraufgeschlagenen Arme durch Enge des Beckens und der Rima vulvae erschwert (Extr. 1/4 Std.) | mässiger Dammriss, sonst normal.                                        | stirbt in partu. Schädel sehr verschoben, fracturirt.                                                                                        |

| Num-<br>mer.                             | Name<br>und<br>Alter. | Anamnese                                              | Becken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kind.                                                               | Kopfstellung.                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.</b>                               | Anna<br>K.<br>29 J.   | 2. Entb.,<br>1. mittelst<br>Perfor.                   | Platt, allgemein<br>verengt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>D. Sp. = 20,5<br>D. Cr. = 24,0<br>Prom. recht hoch<br>stehend, vord.<br>Beckenw. hoch u.<br>steil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Knabe.<br>Gw. 5 Pfd. 28 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 9,0 | 1. Schädellage,<br>Kopf beweglich über<br>der Schamfuge.                                                                                                                                               |
| Klin.<br><sup>15</sup> / <sub>3</sub> 67 |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>16.</b>                               | Rosina<br>A.<br>41 J. | 2. Entb.,<br>1. sechs-<br>monat-<br>liche<br>Frühgeb. | Asymmetrisch in<br>Folge von überstan-<br>dener Coxitis dext.<br>und Nichtgebrauch<br>von Krücken.<br>D. Sp. = 23,0<br>D. Cr. = 22,5<br>D. Tr. = 30,0 cm.<br>Von der Sp. ant. sup.<br>sin. bis zur Sp. post.<br>dextr. = 22,5; von<br>der Sp. ant. sup. dext.<br>bis zur Sp. post. sin.<br>= 20,5. Das v. Hüft-<br>gelenk, nach innen<br>u. oben gedrängt, d.<br>r. Troch. weit nach<br>aussen. Proc. spin.<br>d. letzt. Lendenwir-<br>bels und das Prom.<br>nach r. verschoben,<br>Symph. nach l., der<br>l. Schambogen mehr<br>ausgeschweift, d. r.<br>Beckenwand enorm<br>flach, bes. im hinte-<br>ren Theile gestreckt,<br>die Sp. Isch. in die<br>Höhle hineinragend. | Knabe,<br>kräftig.<br>Gew. 6 Pfd. 8 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 35,0  | 2. Schädellage,<br>Kopf scheinbar tief<br>mit kleinem Seg-<br>ment im Beckenein-<br>gang, Sut. sag. quer<br>hinter der vorderen<br>Beckenw., links von<br>Prom. ein Ohr,<br>Kopf etwas beweg-<br>lich. |
| Pol.<br><sup>15</sup> / <sub>1</sub> 67  |                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |

| Indication.                                                                                                                                                  | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausgang<br>für              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                              |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mutter.                     | Kind.               |
| Rücksicht<br>auf frühere schwere<br>Entbindung, voraus-<br>sichtlich mangelnde<br>Einstellung des<br>Kopfes, Hoffnung,<br>ein lebendes Kind zu<br>entbinden. | 18 Std.            | Blase<br>steht.    | Sprengen der Blase,<br>leichte Umdrehung auf<br>beide Füße, schwieriges<br>Lösen der herauf-<br>geschlagenen Arme,<br>Extr. des Kopfes nur<br>mittelst des scharfen<br>Hakens.                                                                                                            | stirbt<br>nach<br>12 Tagen. | stirbt<br>in partu. |
| Stillstand der Geburt<br>bei ungünstiger<br>Kopfstellung trotz<br>heftiger Wehen.                                                                            | 16 Std.            | vor<br>10 Std.     | Wendg. auf beide Füße<br>leicht, ebenso Extr. des<br>Rumpfes (Rücken nach<br>vorn und links) leicht,<br>schwierige Lösung der<br>heraufgeschlagenen<br>Arme, die manuelle Ent-<br>wicklg. des Kopfes ge-<br>lingt weder im queren<br>noch im 1. schrägen<br>Durchmesser, daher<br>Perfor. | normal.                     | perforirt.          |

## II. Kopflage

| Num-<br>mer.                                  | Name<br>und<br>Alter.       | Anamnese                                           | Becken.                                                                                | Kind.                                                                 | Kopfstellung.                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17.</b><br><br>Klin.<br>$\frac{1}{2}$ 67.  | Anna<br>H.<br>23 J.         | 2. Entb.,<br>1. normal,<br>Kind sehr<br>klein.     | Platt.<br>Cv.=3'' 6''' = 9,5 cm.                                                       | Knabe.<br>Gw. 7 Pfd. 24 L.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 10,5  | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>nahe der Symph.,<br>Kopf beweglich,<br>linke Beckenhälfte<br>● leer. |
| <b>18.</b><br><br>Klin.<br>$\frac{4}{11}$ 66. | Sophie<br>P.<br>26 J.       | 1. Entb.                                           | Platt.<br>Cv.=3'' 6''' = 9,5 cm.<br>Prom. mittelhoch.                                  | Mädchen.                                                              | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>nahe dem Prom.<br>Kopf beweglich auf<br>Eingang.                     |
| <b>19.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{7}{4}$ 70    | Au-<br>guste<br>H.<br>31 J. | 2. Entb.,<br>1. schwer,<br>aber<br>spontan.        | Platt.<br>Cv.=3'' 5''' = 9,2 cm.<br>Prom. sehr vor-<br>springend.                      | Knabe,<br>sehr gross u.<br>kräftig.                                   | 1. Schädellage.<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Pfeil-<br>naht sehr nahe dem<br>Prom., Kopf flach auf<br>Eingang.                 |
| <b>20.</b><br><br>Klin.<br>$\frac{16}{6}$ 70. | Anna<br>H.<br>25 J.         | 1. Entb.                                           | Platt.<br>Cv.=3'' 4''' = 9,0 cm.<br>Prom. tief, vord.<br>Beckenw. gut<br>geneigt.      | Mädchen.<br>Gew. 4 Pfd 8 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 8,75 | 2. Schädellage,<br>Kopf beweglich auf<br>Eingang.                                                                                    |
| <b>21.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{16}{5}$ 70.  | Ama-<br>lie R.<br>35 J.     | 3. Entb.,<br>sonst<br>lang-<br>dauernd,<br>normal. | Platt.<br>Cv.=3'' 4''' = 9,0 cm.                                                       | Knabe.                                                                | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>ziemlich fest auf<br>Eingang.                                             |
| <b>22.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{6}{7}$ 70.   | He-<br>lene P.<br>29 J.     | 2. Entb.,<br>1. schwer,<br>spontan.                | Platt.<br>Cv.=3'' 4''' = 9,0 cm.<br>Dopp. Prom.; das<br>falsche scharf vor-<br>ragend. | Knabe.                                                                | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>beweglich auf<br>Eingang.                                                 |

mit Complication.

| Indication.                                                                                        | Geburts-<br>dauer.     | Blasen-<br>sprung.          | Verlauf.                                                                                                                                                | Ausgang<br>für          |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                                                                         | Mutter.                 | Kind.                          |
| Nicht reponirbarer Vorfall der Nabelschnur, verlangsamter Puls derselben, ungünstige Kopfstellung. | 13 Std.                | vor<br>1 Std.               | Wendg. auf einen Fuss ziemlich leicht u. rasch, ebenso Extr., ein heraufgeschlagener Arm wird leicht gelöst, Kopf passiert mit fühlbarem Ruck das Prom. | normal.                 | leicht asphyct., wiederbelebt. |
| Fieber der Kreissenden, Stillstand der Geburt seit mehreren Stunden bei Wehenschwäche.             | mehr<br>als<br>36 Std. | vor<br>langer<br>Zeit.      | Wendg. u. Extr. ohne grössere Schwierigkeit.                                                                                                            | normal.                 | ante partum gestorben.         |
| Erschöpfung der Gebährenden und beginnender Meteorismus.                                           | 38 Std.                | vor<br>25 Std.              | Wendg. auf beide Füsse leicht, die heraufgeschlagenen Arme schnell gelöst, schwierige aber schnelle Extr. des Kopfes.                                   | normal.                 | asphyct., wiederbelebt.        |
| Nicht reponirbarer Vorfall der Nabelschnur und des rechten Armes.                                  | 14 Std.                | Blase<br>eben<br>gesprengt. | Wendg. auf einen Fuss leicht, Rumpf spontan ausgetrieben, Kopf leicht extrahirt. Nabelschnur pulslos.                                                   | normal.                 | tief asphyct., wiederbelebt.   |
| Nicht reponirbarer Vorfall des rechten Armes.                                                      | etwa<br>14 Std.        | ?                           | Wendg. leicht, Extr. durch Strictur des Muttermundes erschwert.                                                                                         | normal.                 | asphyct., wiederbelebt.        |
| Vorfall der pulslosen Nabelschnur, beginnende Endometritis.                                        | ?                      | ?                           | Wendg. u. Extr. bis zum Kopfe leicht, Kopf wegen des Prom. schwer entwickelt.                                                                           | Endometritis, Genesung. | ante partum gestorben.         |

| Num-<br>mer.                                 | Name<br>und<br>Alter.          | Anamnese                                                                                                                          | Becken.                                                                                                         | Kind.                                                                      | Kopfstellung.                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>23.</b><br><br>Pol.<br>70/71.             | Louise<br>H.<br>28 J.          | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>normal.                                                                                      | Platt.<br>Cv. = $3''3''' = 8,7$ cm.<br>Dopp. Prom., wahres<br>hochstehend, vord.<br>Beckenw. hoch und<br>steil. | Knabe,<br>in beginnen-<br>der Macera-<br>tion.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 34,0 | 2. Stirnlage.<br>Stirn flach auf<br>Eingang.                                                                      |
| <b>24.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{1}{12}$ 66. | Marie<br>P.<br>36 J.           | 5. Entb.<br>1. mit<br>Zange:<br>leb. Kind,<br>2. u. 3.<br>spontan,<br>4. mit<br>Zange:<br>todes K.<br>— alle<br>lang-<br>dauernd. | Platt.<br>Cv. = $3''3''' = 8,75$ cm.                                                                            | Knabe,<br>mässig<br>kräftig.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 36,0                   | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Sut. sag.<br>nahe dem Prom.,<br>Kopf beweglich auf<br>Eingang. |
| <b>25.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{20}{6}$ 70. | Emilie<br>Sch.<br>32 J.        | 1. Entb.                                                                                                                          | Platt.<br>Cv. = $3'' = 8,1$ cm.<br>Prom. sehr hoch,<br>vord. Beckenw. hoch<br>u. steil.                         | Knabe.                                                                     | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung (fast<br>Stirnlage), Kopf sehr<br>hoch über dem<br>Eingang.     |
| <b>26.</b><br>Pol.<br>$\frac{23}{9}$ 66.     | Jo-<br>hanne<br>M.<br>34 J.    | 2. Entb.,<br>1. mit<br>Zange.                                                                                                     | Platt.<br>Cv. = $3'' = 8,1$ cm.                                                                                 | Knabe.                                                                     | 1. Schädellage.                                                                                                   |
| <b>27.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{6}{6}$ 68.  | Caro-<br>line F.<br>35 J.      | 5. Entb.<br>sonst<br>spontan.                                                                                                     | Platt.<br>Cv. = $3'' = 8,0$ cm.                                                                                 | Knabe.                                                                     | 1. Gesichtslage,<br>Gesicht fest auf<br>Eingang.                                                                  |
| <b>28.</b><br><br>Pol.<br>$\frac{9}{8}$ 67.  | Caro-<br>line<br>Sch.<br>26 J. | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>normal.                                                                                      | Platt.<br>Cv. = $3'' = 8,0$ cm.<br>Prom. mittelhoch.                                                            | Mädchen,<br>mässig<br>kräftig.                                             | 1. Schädellage.                                                                                                   |

| Indication.                                                                                                                    | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                      | Ausgang<br>für                                        |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                |                    |                    |                                                                                                                               | Mutter.                                               | Kind.                          |
| Einerseits beginnende Endometritis, Stillstand der Geburt, anderseits voraussichtlich leichte Wendung.                         | über 40 Std.       | vor etwa 36 Std.   | Wendg. u. Extr. leicht.                                                                                                       | Atonie des Uterus, Blutung, Phlebotrombose, Genesung. | ante partum gestorben.         |
| Fieber der Gebärenden, Stillstand der Geburt seit mehreren Stunden bei Wehenschwäche.                                          | etwa 24 Std.       | vor etwa 15 Std.   | Wendg. auf beide Füße und Extr. leicht.                                                                                       | Riss am Muttermund, Pelveperitonitis, Genesung.       | normal.                        |
| Vorfall der Nabelschnur und des r. Armes.                                                                                      | 10 Std.            | vor 4 Std.         | Wendg. u. Extr. bis zum Kopfe leicht, Entwicklung des Kopfes mässig schwer, weil Kinn am Prom. hängen bleibt.                 | normal.                                               | asphyct., wiederbelebt.        |
| Anmerkung. Im nächsten Jahre spontane schnelle Schädelgeburt: Vorderscheiteleinstellung mit Vorfall der pulslosen Nabelschnur. |                    |                    |                                                                                                                               |                                                       |                                |
| Nicht reponirbarer Vorfall der Nabelschnur.                                                                                    | etwa 20 Std.       | eben erfolgt.      | Wendg. auf beide Füße u. Extr. ohne Schwierigkeit.                                                                            | normal.                                               | normal.                        |
| Collaps der Kreissenden.                                                                                                       | 17 Std.            | vor 12 Std.        | Wendg. auf einen Fuss, Extr. ziemlich leicht.                                                                                 | stirbt nach 4 Tagen an Peritonitis.                   | stirbt in partu.               |
| Nicht reponirbarer Vorfall der Nabelschnur.                                                                                    | 12 Std.            | vor 1½ Std.        | Fassen des Fusses durch stricturirten Muttermund erschwert, Umdrehung leicht, Extr. d. Kopfes durch obige Strictur verzögert. | normal.                                               | mässig asphyct., wiederbelebt. |

| Num-<br>mer.                              | Name<br>und<br>Alter.         | Anamnese                                                                                      | Becken.                                                                                                                   | Kind.                                                    | Kopfstellung.                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>29.</b>                                | Jo-<br>hanne<br>Sch.<br>26 J. | 2. Entb.,<br>1. normal.                                                                       | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. hochstehend.                                                                        | Knabe.<br>mässig gross.                                  | 1. Schädellage,<br>Kopf beweglich über<br>dem Eingang.                                                                                                       |
| Pol.<br><sup>5</sup> / <sub>4</sub> 67.   |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>30.</b>                                | Caro-<br>line N.<br>31 J.     | 3. Entb.,<br>1. u. 2. mit<br>Zange:<br>Kinder<br>todd.                                        | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. mittelhoch.                                                                         | Mädchen.                                                 | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung.                                                                                                           |
| Pol.<br><sup>18</sup> / <sub>9</sub> 67.  |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>31.</b>                                | Au-<br>guste<br>F.<br>23 J.   | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>normal.                                                  | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. hoch, vord.<br>Beckenw. hoch und<br>steil.                                          | Knabe.                                                   | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>fest auf Eingang.                                                                                 |
| Pol.<br><sup>23</sup> / <sub>7</sub> 70.  |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>32.</b>                                | Paul-<br>ine<br>Dz.<br>29 J.  | 4. Entb.,<br>sonst<br>lang-<br>dauernd,<br>normal.                                            | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. hoch, vord.<br>Beckenw. hoch und<br>steil.                             | Mädchen.                                                 | 1. Schädellage.                                                                                                                                              |
| Pol.<br><sup>2</sup> / <sub>12</sub> 71.  |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>33.</b>                                | Hen-<br>riette<br>H.<br>30 J. | 2. Entb.,<br>1. sehr<br>lang-<br>dauernd,<br>spontan,<br>Kindstarb<br>bald nach<br>d. Geburt. | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. scharf vor-<br>springend, vord.<br>Beckenw. ziemlich<br>hoch u. steil. | Mädchen,<br>gross und<br>kräftig. Kopf-<br>knochen hart. | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Pfeil-<br>naht nahe dem<br>Prom., Kopf beweg-<br>lich auf Eingang,<br>linke Seite des Ein-<br>gangs leer. |
| Pol.<br><sup>23</sup> / <sub>10</sub> 69. |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |
| <b>34.</b>                                | The-<br>rese<br>H.<br>44 J.   | 3. Entb.,<br>sonst<br>lang-<br>dauernd,<br>normal.                                            | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.                                                                                 | Knabe.<br>Schädel auf-<br>fallend hart.                  | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Pfeil-<br>naht dem Prom. ge-<br>nähert, Kopf etwas<br>beweglich.                                          |
| Pol.<br><sup>7</sup> / <sub>1</sub> 72.   |                               |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                              |

| Indication.                                                                                                                               | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.                 | Verlauf.                                                                                                                                                                                                                   | Ausgang<br>für                                    |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                            | Mutter.                                           | Kind.                                                                   |
| Vorfall der Nabel-<br>schnur, des l. Armes,<br>des r. Fusses.                                                                             | 17 Std.            | vor<br>5 Std.                      | Wendg., bei der Extr.<br>dreht sich der Rumpf<br>mit dem Bauche nach<br>vorn u. links, allmählig<br>nach vorn, zuletzt nach<br>rechts u. hinten, die Ent-<br>wicklung des Kopfes<br>schwierig, durch Wehen<br>unterstützt. | normal.                                           | stirbt<br>in partu.                                                     |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                                                                                       | 16 Std.            | vor<br>1 Std.                      | Wendg. u. Extr. bis zum<br>Kopfe leicht, Entwicke-<br>lung des letzteren<br>schwer.                                                                                                                                        | normal.                                           | stirbt<br>in partu.                                                     |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                                                                                       | etwa<br>15 Std.    | vor<br>1½<br>Std.                  | Wendg. schwer, Extr.<br>mit Rücken hinten<br>mässig schwer, beim<br>Durchtritt d. Schultern<br>dreht sich der Rücken<br>nach vorn.                                                                                         | normal.                                           | stirbt<br>in partu.                                                     |
| Ruptur des Uterus.                                                                                                                        | 20 Std.            | vor<br>16 Std.                     | Wendg. u. Extr. bis zum<br>Kopfe leicht, Kopf we-<br>gen des Prom. schwer<br>entwickelt.                                                                                                                                   | stirbt<br>nach<br>24 Std.                         | ante<br>partum<br>gestorben.<br>Tiefe Im-<br>pression<br>am<br>Schädel. |
| Fieber der Kreissen-<br>den, Stillstand der<br>Geburtstrotzhäufiger<br>Wehen; anderseits<br>Wendung voraus-<br>sichtlich nicht<br>schwer. | 21 Std.            | vor<br>6 Std.                      | Wendg. auf beide Füße<br>sehr schwer, Nabel-<br>schnurpuls sistirt, Extr.<br>des Kopfes dadurch, dass<br>Kinn am Prom. hängen<br>bleibt, sehr schwer.                                                                      | normal.                                           | stirbt<br>in partu.<br>Tiefe Im-<br>pression<br>am<br>Schädel.          |
| Fieber der Kreissen-<br>den, unveränderter<br>Kopfstand.                                                                                  | über<br>24 Std.    | vor<br>We-<br>hen-<br>be-<br>ginn. | Wendg. nur auf beide<br>Füße möglich, durch<br>dopp. Handgriff, Rumpf<br>folgt spontan, Kopf<br>schwer entwickelt.<br>(Dauer der Operation<br>½ Std.)                                                                      | stirbt<br>nach<br>4 Tagen<br>an Perito-<br>nitis. | stirbt<br>in partu.                                                     |

| Num-<br>mer.                                                  | Name<br>und<br>Alter.     | Anamnese                                                   | Becken.                                                                                                                                                                        | Kind.                                                                         | Kopfstellung.                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>35.</b><br>Pol.<br><sup>10</sup> / <sub>3</sub> 67.        | Auguste<br>R.<br>20 J.    | 1. Entb.                                                   | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm,                                                                                                                                                   | Knabe.                                                                        | 1. Schädellage,<br>Sut. sag. nahe des<br>Prom., Kopf bewe-<br>lich auf Eingang                                      |
| <b>36.</b><br><br><br>Pol.<br><sup>6</sup> / <sub>1</sub> 71. | Rosina<br>R.<br>32 J.     | 2. Entb.,<br>1. normal.                                    | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. sehr hoch,<br>vord. Beckenw. sehr<br>steil u. hoch.                                                                                      | Knabe.<br>Gw. 9 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> Pfd.<br>Kopfknochen<br>sehr fest. | 1. Schädellage.<br>Vorderscheitel-<br>einstellung mit D<br>viation des Kopfes<br>nach vorn.                         |
| <b>37.</b><br><br>Klin.<br><sup>29</sup> / <sub>1</sub> 69.   | Anna<br>Sch.<br>29 J.     | 3. Entb.,<br>sonst<br>normal.                              | Platt.<br>Cv.=2"10"=7,65cm.<br>D. Sp. = 20,5<br>D. Cr. = 22,5<br>Prom. niedrig, sehr<br>vorrangend, vord.<br>Beckenw. hoch, gut<br>geneigt, Kreuzbein<br>fast grade gestreckt. | Knabe.<br>Gw. 6Pfd. 25 L.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 8,0            | 2. Schädellage,<br>Kopf beweglich über<br>der vorderen<br>Beckenwand.                                               |
| <b>38.</b><br>Pol.<br><sup>20</sup> / <sub>9</sub> 67.        | Emilie<br>W.<br>29 J.     | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>m. Zange;<br>K. todt. | Platt.<br>Cv. = 2" 9—10"<br>= 7,5 cm.                                                                                                                                          | Knabe.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 34,0                                            | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>beweglich auf<br>Eingang.                                |
| <b>39.</b><br>Pol.<br><sup>26</sup> / <sub>3</sub> 70.        | Anna<br>Sch.<br>25 J.     | 1. Entb.                                                   | Platt, rhachitisch.<br>Cv.=2" 9"=7,4 cm.<br>Prom. hoch, Symph.<br>hoch u. steil.                                                                                               | Knabe.                                                                        | 1. Kopflage,<br>Uebergangsform von<br>Stirn- in Gesichts-<br>lage, Kopf beweg-<br>lich auf Eingang.                 |
| <b>40.</b><br>Pol.<br><sup>1</sup> / <sub>3</sub> 70.         | Caro-<br>line B.<br>38 J. | 5. Entb.,<br>stets<br>schwer<br>ent-<br>bunden.            | Platt, rhachitisch.<br>Cv.=2" 9"=7,4 cm.                                                                                                                                       | Knabe,<br>sehr gross u.<br>stark.                                             | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>sehr hoch, beweg-<br>lich. Linke Becken-<br>hälfte leer. |

| Indication.                                                                    | Geburts-<br>dauer.                    | Blasen-<br>sprung.                           | Verlauf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausgang<br>für                                    |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mutter.                                           | Kind.                                                                                          |
| Mutter beginnt zu<br>leiden.                                                   | etwa<br>24 Std.                       | vor<br>etwa<br>20 Std.                       | Wendg. auf einen Fuss,<br>Extr. des Kopfes ver-<br>zögert sich.                                                                                                                                                                                                                                          | normal.                                           | stirbt<br>asphyct.                                                                             |
| Fieber der Mutter,<br>Stillstand der Ge-<br>burt trotz energi-<br>scher Wehen. | 21 Std.                               | vor<br>11 Std.                               | Wendg. leicht, Extr. d.<br>starken Steisses sehr<br>schwer, beide Arme her-<br>aufgeschlagen, Kopf ist<br>manuell nicht zu ent-<br>wickeln, da Kinn am<br>Prom. hängen bleibt u.<br>Querstellung nicht ge-<br>lingt; daher Perf. und<br>Keph.<br>(Operationsdauer<br>1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> Std.) | normal.                                           | perforirt.                                                                                     |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                            | 10 Std.                               | Blase<br>wird<br>eben<br>ge-<br>sprengt.     | Wendg. auf einen Fuss<br>u. Extr. bis zum Kopfe<br>leicht, Puls der Nabel-<br>schnur sistirt, Kopf rel.<br>schwer entwickelt.                                                                                                                                                                            | normal.                                           | tief<br>asphyct.,<br>mit Mühe<br>wieder-<br>belebt.<br>Tiefe Im-<br>pression<br>am<br>Schädel. |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                            | 28 Std.                               | vor<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Std. | Wendg. u. Extr. bis zum<br>Kopfe leicht, Entwick-<br>lung des Kopfes sehr<br>schwer.                                                                                                                                                                                                                     | normal.                                           | tief<br>asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                                        |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                            | 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Std. | vor<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Std. | Wendg. leicht, ein her-<br>aufgeschlagener Arm<br>schwer gelöst, Kopf<br>schwer aber rasch ent-<br>wickelt.                                                                                                                                                                                              | stirbt<br>nach<br>4 Tagen<br>an Pneu-<br>monie.   | tief<br>asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                                        |
| Placenta profunda,<br>Metrorrhagie.                                            | 7 Std.                                | ?                                            | Wendg. u. Extr. ziem-<br>lich leicht.                                                                                                                                                                                                                                                                    | stirbt<br>nach<br>3 Tagen<br>an Peri-<br>tonitis. | ante<br>partum<br>gestorben.<br>Starke<br>Nahtver-<br>schiebung                                |

| Num-<br>mer.                          | Name<br>und<br>Alter.     | Anamnese                                                                                        | Becken.                                                                                                                                                                                                                             | Kind.                                                 | Kopfstellung.                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41.<br><br>Pol.<br>$\frac{6}{6}$ 70.  | Christiane<br>M.<br>31 J. | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>Zange.                                                     | Platt.<br>Cv. = 2" 8''' = 7,2 cm.<br>Dopp. Prom.,<br>1. Prom. hoch. Vord.<br>Beckenw. steil.                                                                                                                                        | Knabe,<br>sehr gross u.<br>kräftig.                   | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>beweglich auf<br>Eingang.                        |
| 42.<br><br>Pol.<br>$\frac{16}{6}$ 71. | Therese L.<br>32 J.       | 4. Entb.,<br>sonst<br>spontan,<br>lang-<br>dauernd.                                             | Platt.<br>Cv. = 2" 8''' = 7,2 cm.<br>Dopp. Prom., das<br>wahre sehr hoch,<br>vord. Beckenw. steil.                                                                                                                                  | Knabe.                                                | 1. Schädellage,<br>vordere Scheitel-<br>beinlage, dicht hi-<br>ter der Schamfu-<br>ein Ohr.                 |
| 43.<br><br>Pol.<br>$\frac{22}{3}$ 69. | Susanne<br>B.<br>29 J.    | 3. Entb.,<br>1. schwer:<br>kleines<br>Kind,<br>2.: Wen-<br>dung u.<br>Perfor.                   | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 2" 8''' = 7,2 cm.                                                                                                                                                                                      | Knabe,<br>Kopf sehr<br>gross.                         | 1. Schädellage,<br>spontan aus Schie-<br>lage hervorgegan-<br>gen. Kopf mit<br>grossem Theil in<br>Eingang. |
| 44.<br><br>Pol.<br>$\frac{2}{6}$ 70.  | Marie<br>L.<br>42 J.      | 7. Entb.,<br>sonst<br>theils<br>durch<br>Zange,<br>theils<br>durch<br>Wendg.<br>ent-<br>bunden. | Platt, allgemein<br>verengt.<br>Cv. = 3" 2''' = 8,5 cm.<br>D. Sp. = 23,5<br>D. Cr. = 23,0<br>Querdurchmesser d.<br>Eingangs = 12,0.<br>An der hint. Fläche<br>des Schambeins zwei<br>mehr als erbsen-<br>grosse Knochen-<br>buckel. | Knabe.<br>Gw. 7 Pfd. 25 L.<br>K. = 37,0<br>Qu. = 10,0 | 2. Gesichtslage.<br>Gesicht hoch über<br>dem Eingang.                                                       |

| Indication.                                              | Geburtsdauer. | Blasensprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                                                            | Ausgang für                                                                     |                       |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                          |               |               |                                                                                                                                                                                                                     | Mutter.                                                                         | Kind.                 |
| Fieber und Meteorismus der Mutter, Stillstand d. Geburt. | 60 Std.       | vor 48 Std.   | Wendg. wegen Contraction des Uterus sehr schwer, ebenso Extr. des Rumpfes, Nabelschnurpuls sistirt, Kopf wegen Stellung mit Sut. sag. in Conj. nur durch Perf. u. Keph. zu entwickeln. (Dauer der Operation 4 Std.) | Nachblutung, Peritonitis, Tod nach 2 Tagen.                                     | perforirt.            |
| Fieber der Kreissenden, unveränderte Kopfstellung.       | 12 Std.       | vor 7 Std.    | Wendg. wegen Contraction des Uterus schwer, durch dopp. Handgriff, Extr. leicht.                                                                                                                                    | stirbt nach 2 Tagen an Peritonitis, wahrschl. Folge von unmerkter Uterusruptur. | normal.               |
| Nicht reponirbarer Nabelschnurvorfall.                   | 9 Std.        | eben erfolgt. | Erfassen d. Füße leicht, Umdrehung aber gelingt erst nach Perf. d. Kopfes.                                                                                                                                          | stirbt nach 7 Tagen an Peritonitis.                                             | perforirt.            |
| Ruptur des Uterus (Füße in der Bauchhöhle).              | ?             | ?             | Wendg. u. Extr. Entwicklung des Kopfes durch die Enge ziemlich schwer.                                                                                                                                              | stirbt nach 5 Tagen an Peritonitis.                                             | ante partum gestorben |

| Num-<br>mer.                                         | Name<br>und<br>Alter.          | Anamnese                                  | Becken.                                                                                                                                                                                                                          | Kind.                                                                         | Kopfstellung.                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.<br><br>Pol.<br><sup>9</sup> / <sub>3</sub> 70.   | Mat-<br>thilde<br>R.<br>31 J.  | 2. Entb.,<br>1. mit<br>Zange:<br>K. todt. | Platt, allgemein<br>verengt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>D. Sp. = 22,0<br>D. Cr. = 22,5<br>Prom. sehr tief, weit<br>vorrangend, vord.<br>Beckenw. gut<br>geneigt.                                                                   | Knabe.<br>Gw. 5 Pfd. 15 L.<br>Kopf klein.<br>Bit. Qu. = 7,5<br>Bip. Qu. = 9,3 | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>Eingang.                                                                                                     |
| 46.<br><br>Pol.<br><sup>12</sup> / <sub>4</sub> 67.  | Fran-<br>ziska<br>Th.<br>23 J. | 1. Entb.                                  | Platt, wahrscheinl.<br>allg. verengt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>D. Sp. = 21,0<br>D. Cr. = 23,0<br>Prom. mittelhoch.                                                                                                               | Mädchen,<br>sehr kräftig.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 35,0                         | 1. Schädellage,<br>Hinterscheitel-<br>einstellung, Sut. <del>se</del><br>nahe dem Prom.<br>Kopf auf Eingangs-<br>beweglich.                                             |
| 47.<br><br>Pol.<br><sup>15</sup> / <sub>8</sub> 67.  | Emilie<br>H.<br>31 J.          | 2. Entb.,<br>1. mit<br>Zange:<br>K. todt. | Rhachitisch, platt,<br>allg. verengt.<br>C. d. = 9,5 cm.<br>D. Sp. = 23,0<br>D. Cr. = 23,5<br>Prom. sehr hoch.<br>(Allg. Verengerung<br>erst während d. Ope-<br>ration erkannt.)                                                 | Mädchen,<br>mässig<br>kräftig.<br>K. (nach Perf.)<br>= 31,0<br>Sch. = 33,0    | 1. Schädellage,<br>Mittelscheiteleinstellung (aus Vorde-<br>scheiteleinstellung hervorgegangen).<br>Pfeilnaht nahe de<br>Prom., Kopf bewe-<br>lich über dem<br>Eingang. |
| 48.<br><br>Klin.<br><sup>12</sup> / <sub>1</sub> 70. | Caro-<br>line H.<br>35 J.      | 1. Entb.                                  | Rhachitisch, platt,<br>allgemein zu eng.<br>Cv. = 2" 10" = 7,6 cm.<br>D. Sp. = 22,5<br>D. Cr. = 23,5<br>Prom. tiefstehend,<br>scharf vorragend.                                                                                  | Mädchen,<br>Gew. 6 Pfd. 4 L.<br>K. = 36,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 9,0         | 2. Gesichtslage,<br>Gesicht fest auf Ein-<br>gang, Schädel an d.<br>rechten Seite der<br>Lendenwirbelsäule                                                              |
| 49.<br><br>Pol.<br><sup>15</sup> / <sub>2</sub> 71.  | Marie<br>H.<br>28 J.           | ?                                         | Platt,<br>allgemein zu eng.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>D. Sp. = 24,5<br>D. Cr. = 25,0<br>Prom. hoch, vord.<br>Beckenw. hoch u.<br>steil, der untere<br>Beckenabschnitt<br>allg. zu eng (wäh-<br>rend der Operation<br>erkannt.) | Mädchen,<br>sehr gross,<br>Kopf sehr<br>gross u. stark-<br>knochig.           | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>fest auf Eingang                                                                                             |

| Indication.                                                                                                                               | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.    | Verlauf.                                                                                                                                                                                                | Ausgang<br>für                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                           |                    |                       |                                                                                                                                                                                                         | Mutter.                                                                                          | Kind.                                   |
| Nicht reponirbarer<br>Vorfall der Nabel-<br>schnur.                                                                                       | 3½<br>Std.         | vor<br>1½<br>Std.     | Wendg. u. Extr. ziem-<br>lich leicht.                                                                                                                                                                   | normal.                                                                                          | tief<br>asphyet.,<br>wieder-<br>belebt. |
| Fieber u. beginnen-<br>der Collaps der<br>Mutter, verlangsamer<br>Fötal puls.                                                             | 70 Std.            | vor<br>34 Std.        | Fassen des Fusses wegen<br>Uterus-Contraction<br>schwierig, Wendg. auf<br>einen Fuss zieml. leicht,<br>Austreibung d. Rumpfes<br>und des Kopfes spontan.                                                | normal.                                                                                          | stirbt<br>in partu.                     |
| Kreissende beginnt<br>zu leiden.                                                                                                          | 15 Std.            | vor<br>12 Std.        | Wendg. gelingt nur auf<br>beide Füße, erschwert<br>durch Stricture d. Mutter-<br>munds, ebenso Extr. des<br>Rumpfes erschwert,<br>schwierige Perfor. und<br>Extr. des hochstehenden<br>Kopfes.          | stirbt<br>nach<br>3 Tagen<br>an Peri-<br>tonitis.                                                | perforirt.                              |
| Leiden der Kreissen-<br>den, Stillstand der<br>Geburt trotz stür-<br>mischer Wehen, an-<br>dersseits Perfor. vor-<br>aussichtlich schwer. | ?                  | ?                     | Wendg. durch Uterus-<br>contraction u. Becken-<br>enge sehr erschwert, die<br>heraufgeschlagenen<br>Arme und der Kopf mit<br>Mühe entwickelt.                                                           | in Chloro-<br>form-<br>narkose<br>collabirt,<br>mit Mühe<br>zu sich ge-<br>bracht.<br>Ges. entl. | stirbt<br>in partu.                     |
| Fieber der Kreissen-<br>den, Hoffnung, ein<br>lebendes Kind zu<br>entwickeln.                                                             | 19 Std.            | eben<br>er-<br>folgt. | Erfassen der Füße<br>leicht, Umdrehung ge-<br>lingt erst nach Perfor.<br>des Kopfes, und auch da<br>sehr schwer, Extraction<br>des Rumpfes und des<br>Kopfes (mit Sut. sag. in<br>Conj.) sehr mühselig. | stirbt<br>nach<br>2 Stunden<br>im Choc.                                                          | perforirt.                              |

| Num-<br>mer.                        | Name<br>und<br>Alter.         | Anamnese                                                                                                                                    | Becken.                                                                                                                                                                                                                         | Kind.                                                                                   | Kopfstellung.                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>50.</b><br><br>Klin.<br>9/11 69. | The-<br>rese M.<br>37 J.      | 1. Geburt.<br>(leidet an<br>Nephritis)                                                                                                      | Platt, asymmetrisch.<br>Cv. kaum 3" = 8,0 cm.<br>Becken hoch u. steil,<br>rechte Hälfte enger<br>u. abgeflachter,<br>Prom. sehr hoch,<br>nach rechts deviirt.<br>vord. Beckenw. steil<br>u. hoch, Kreuzbein<br>gradlinig, lang. | Knabe.<br>Gw. 5 Pfd. 18 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 35,0<br>Qu. = 8,5                     | 1. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Sut. sa-<br>der Symph. ge-<br>nähert, Kopf auf Ein-<br>gang angedrückt. |
| <b>51.</b><br><br>Pol.<br>25/10 71. | Ottilie<br>B.<br>28 J.        | 2. Entb.,<br>1. normal.<br>In Folge<br>einer Lu-<br>xation des<br>linken Un-<br>terschen-<br>kels (in d.<br>Kindheit)<br>starkes<br>Hinken. | Rhachitisch, platt,<br>asymmetrisch.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>Prom. mittelhoch,<br>stark nach rechts<br>verschoben, vordere<br>Beckenw. niedrig,<br>gut geneigt.                                                             | Knabe.                                                                                  | 2. Schädellage,<br>Vorderscheitel-<br>einstellung, Kopf<br>beweglich auf Ein-<br>gang, linke Becken-<br>hälfte leer.       |
| <b>52.</b><br><br>Klin.<br>12/4 69. | Erne-<br>stine<br>S.<br>30 J. | 2. Entb.,<br>1. in<br>Steisslage<br>(Vgl.<br>Nr. 108.)                                                                                      | Coxalgisches asym-<br>metrisches rechts-<br>seitig und allgemein<br>verengtes Becken.                                                                                                                                           | Knabe.<br>Gw. 4 Pfd.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 31,0<br>Qu. = 9,5<br>Künstl.<br>Frühgeburt. | 2. Schädellage,<br>Sut. sag. zwischen<br>querem u. 2. schrä-<br>gem Durchmesser,<br>Kopf hoch, beweg-<br>lich auf Eingang. |

| Indication.                            | Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.                       | Verlauf.                                                                                                                                                                                                                   | Ausgang<br>für                                      |                                                    |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                        |                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                            | Mutter.                                             | Kind.                                              |
| Vorfall der Nabel-<br>schnur, pulslos. | 10 Std.            | eben<br>er-<br>folgt.                    | Wendg. sehr schwer, so-<br>wohl wegen Enge des<br>Beckens als auch wegen<br>fester Uteruscontrac-<br>tion, Extr. rel. leicht,<br>Kopf tritt im 2. schrä-<br>gen Durchmesser mit<br>Stirn vorn rechts durch<br>den Eingang. | stirbt<br>in näch-<br>ster Zeit<br>an<br>Nephritis. | ante<br>partum<br>gestorben                        |
| Vorfall der Nabel-<br>schnur.          | 22 Std.            | vor<br>$\frac{1}{2}$ Std.                | Wendg. auf einen Fuss<br>u. Extr. in 1. Fusslage.<br>Entwicklung der herauf-<br>geschlagenen Arme und<br>des Kopfes schwer.                                                                                                | normal.                                             | leicht<br>asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.          |
| Vorfall von Hand<br>und Fuss.          | 8 Std.             | Blase<br>wird<br>eben<br>ge-<br>sprengt. | Wendg., Nabelschnur<br>pulslos, Rumpf fast<br>spontan ausgetrieben<br>mit Rücken nach vorn<br>und rechts, Kopf wird<br>im 2. schrägen Durch-<br>messer leicht extrahirt.                                                   | normal.                                             | tief<br>asphyct.,<br>mit Mühe<br>wieder-<br>belebt |

III. Quer- und

| Num-<br>mer.                                                | Name<br>und<br>Alter.          | Anamnese.                                                                                                                                                                                                           | Becken.                                                                                                                                                                 | Kind.                                                                 | Lage.                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>53.</b><br><br>Klin.<br><sup>18</sup> / <sub>5</sub> 68. | Jo-<br>hanne<br>St.<br>23 J.   | 2. Entb.,<br>1. normal.                                                                                                                                                                                             | Platt.<br>Cv.=3'' 6''' = 9,5 cm.<br>Prom. mittelhoch,<br>vord. Beckenw. gut<br>geneigt.                                                                                 | Mädchen.<br>Gw. 6 Pfd. 25 L.<br>K. = 35,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 9,5 | 2. Querlage.                                                                                 |
| <b>54.</b><br><br>Pol.<br><sup>15</sup> / <sub>4</sub> 69.  | Chri-<br>stiane<br>B.<br>26 J. | 6. Entb.,<br>4mal spontan,<br>das 5. mal mit<br>Zange.                                                                                                                                                              | Platt.<br>Cv.=3'' 5''' = 9,2 cm.<br>Dopp. Prom., das<br>wahre sehr hoch<br>stehend, das falsche<br>sehr vorspringend,<br>vord. Beckenw.<br>mässig hoch, gut<br>geneigt. | Knabe,<br>Kopf sehr<br>gross.                                         | Vernachlässigt<br>2. Querlage<br>1. Unterart,<br>Vorfall der pul-<br>losen Nabel-<br>schnur. |
| <b>55.</b><br><br>Pol.<br><sup>25</sup> / <sub>4</sub> 70.  | „ „<br>27 J.                   | 7. Entb.<br>„ „                                                                                                                                                                                                     | „ „                                                                                                                                                                     | Mädchen.                                                              | 1. Querlage<br>2. Unterart,<br>Vorfall d. linken<br>Armes.                                   |
| <b>56.</b><br><br>Pol.<br><sup>27</sup> / <sub>12</sub> 71. | Jo-<br>hanne<br>B.<br>30 J.    | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>normal.<br>Verdacht auf<br>Tuberculose.                                                                                                                                        | Platt.<br>Cv.=3'' 4''' = 9,0 cm.<br>Dopp. Prom.                                                                                                                         | Mädchen,<br>mittelgross.                                              | 1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                               |
| <b>57.</b><br><br>Klin.<br><sup>6</sup> / <sub>12</sub> 65. | The-<br>rese M.<br>37 J.       | 7. Entb.,<br>1. Schulter-<br>lage: Wendg.<br>u. Extr.,<br>K. todt.<br>2. Fussl.: leb.<br>3. Kopf.: todt.<br>4. Fussl.: todt.<br>5. Schiefelage:<br>Wendg. u.<br>Extr., K. todt.<br>6. Kopfelage:<br>Zange, K. todt. | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = etwas über<br>3'' 3''' = 9,0 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                                                     | Mädchen,<br>Gw. 7 Pfd. 5 L.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 36,0               | 1. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Placenta pro-<br>funda,<br>Vorfall des<br>rechten Armes    |

# Schief lagen.

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                  | Ausgang<br>für                                                                |                                                                                 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    |                                                                                                                                                                           | Mutter.                                                                       | Kind.                                                                           |
| 5 Std.             | vor<br>5 Std.      | Wendg. auf einen Fuss leicht, spontane Austreibung bis zur Brust, Sistirung des Nabelschnurpulses, Extr. durch das Prom. erschwert.                                       | normal.                                                                       | tief asphyct., mit Mühe wiederbelebt                                            |
| 13 Std.            | vor<br>5 Std.      | Beim Fassen des Fusses Vorfall der Placenta, Wendg. wegen Uteruscontraction schwer, Extr. des Kopfes mühselig.                                                            | erkrankt, Genesung.                                                           | ante partum gestorben.                                                          |
| 16 Std.            | vor<br>3 Std.      | Wendg. durch Uteruscontraction erschwert, Extr. wegen des 2. Prom. schwierig.                                                                                             | normal.                                                                       | ante partum gestorben.                                                          |
| 24 Std.            | Blase steht.       | Sprengen der Blase, Wendg. u. Extr. leicht und schnell (ohne Chloroform).                                                                                                 | stirbt nach 24 Std., wahrschl. in Folge der Circulationsstörung in d. Lungen. | leicht asphyct., wiederbelebt.                                                  |
| ?                  | eben erfolgt.      | Wendg. nur auf beide Füße leicht, Blutung aus der theilweise gelösten Plac., schwierige Extr. des Rumpfes, Puls der Nabelschnur sistirt, Arme und Kopf schwer entwickelt. | normal.                                                                       | tief asphyct., mit Mühe wiederbelebt. Tiefe Impression am Schädel. Gesund entl. |

| Num-<br>mer.                               | Name<br>und<br>Alter.           | Anamnese.                                              | Becken.                                                                                                                                                      | Kind.                                                                                           | Lage.                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>58.</b>                                 | „ „                             | „ „                                                    | „ „                                                                                                                                                          | Knabe,<br>Gw. 5 Pfd. 25 L.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 33,0<br>Qu. = 9,0<br>Künstl. Früh-<br>geburt. | 2. Querlage<br>Placenta pro-<br>funda.                        |
| Klin.<br><sup>25</sup> / <sub>1</sub> 68.  |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>59.</b>                                 | Christiane<br>M.<br>28 J.       | 4. Entb.                                               | Platt.<br>Cv. = 3'' 3''' = 8,8 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                                                                     | Knabe,<br>Gw. 7 Pfd. 10 L.                                                                      | 2. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Vorfall des<br>linken Arms. |
| Klin.<br><sup>13</sup> / <sub>1</sub> 66.  |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>60.</b>                                 | Marie<br>Sch.<br>30 J.          | 2. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd, mit<br>Zange.        | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.                                                                                                              | Knabe.                                                                                          | 2. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Vorfall des<br>linken Arms. |
| Pol.<br><sup>5</sup> / <sub>8</sub> 71.    |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>61.</b>                                 | Hen-<br>riette<br>Sch.<br>34 J. | 2. Entb.,<br>1. normal.                                | Platt.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.                                                                                                                           | Knabe,<br>kräftig.                                                                              | 1. Schiefelage<br>1. Unterart.                                |
| Pol.<br><sup>21</sup> / <sub>7</sub> 68.   |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>62.</b>                                 | Au-<br>guste<br>Sch.<br>32 J.   | 5. Entb.,<br>2mal durch<br>Zange, 1mal<br>durch Wendg. | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.<br>Prom. hoch, vord.<br>Beckenw. steil.                                                                      | Knabe.                                                                                          | 1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                |
| Pol.<br><sup>8</sup> / <sub>7</sub> 70.    |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>63.</b>                                 | Elisa-<br>beth<br>R.<br>28 J.   | 2. Entb.,<br>1. normal.                                | Platt.<br>Cv. = 3'' 2''' = 8,5 cm.                                                                                                                           | Mädchen.                                                                                        | 1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                |
| Pol.<br><sup>26</sup> / <sub>3</sub> 68.   |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |
| <b>64.</b>                                 | Minna<br>V.<br>36 J.            | 4. Entb.,<br>sonstspontan,<br>todte Kinder.            | Platt.<br>Cv. = 3'' 1—2'''<br>= 8,3 cm.<br>D. Sp. = 24,0<br>D. Cr. = 28,0<br>Prom. tiefstehend,<br>sehr vorspringend,<br>vord. Beckenw. nie-<br>drig, steil. | Mädchen,<br>Gw. 5 Pfd. 3 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 9,0                            | 2. Querlage,<br>Vorfall einer<br>Hand.                        |
| Klin.<br><sup>17</sup> / <sub>11</sub> 67. |                                 |                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                               |

| Geburts-<br>dauer.      | Blasen-<br>sprung.     | Verlauf.                                                                                                                                                                                                     | Ausgang<br>für |                                      |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                              | Mutter.        | Kind.                                |
| 7 Std.                  | Blase<br>steht.        | Sprengen der Blase, Umdrehung an-<br>fangs durch Uteruscontraction er-<br>schwert, Blutung aus der theilweise<br>gelösten Plac., Fötalpulssistirt, Extr.<br>des Steisses schwer, ebenso die des<br>Kopfes.   | normal.        | asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.      |
| ?                       | vor<br>24 Std.         | Wendg. wegen Uteruscontraction<br>schwierig, sehr langsam, Extr. des<br>Kopfes durch das Prom. erschwert.                                                                                                    | normal.        | ante partum<br>gestorben.            |
| etwa<br>6 Std.          | eben<br>er-<br>folgt.  | Wendg. u. Extr. leicht.                                                                                                                                                                                      | normal.        | normal.                              |
| ?                       | vor<br>34 Std.         | Wendg. durch Uteruscontraction<br>erschwert, Extr. durch Unterstützung<br>der Wehen leicht.                                                                                                                  | normal.        | stirbt<br>asphyct.                   |
| etwa<br>24 Std.         | vor<br>etwa<br>16 Std. | Wendg. u. Extr. leicht u. schnell.                                                                                                                                                                           | normal.        | ante partum<br>gestorben.            |
| 6 Std.                  | vor<br>1 Std.          | Wendg. u. Extr. d. Rumpfes leicht,<br>Kopf wegen ungünstiger Einstellung<br>(mit Sut. sag. im 1. schrägen Durch-<br>messer, Hinterhaupt hinten) erst nach<br>mühseliger Querstellung leicht ent-<br>wickelt. | normal.        | stirbt<br>in partu.                  |
| 8 $\frac{1}{2}$<br>Std. | eben<br>er-<br>folgt.  | Wendg. durch Prom. u. stürmische<br>Wehen verzögert, Fötalpulssinkt,<br>Austreibung des Rumpfes spontan,<br>Arme leicht gelöst, Kopf mit Mühe<br>durch den Eingang entwickelt.                               | normal.        | tief asphyct.,<br>wieder-<br>belebt. |

| Num-<br>mer.                    | Name<br>und<br>Alter.           | Anamnese.                                                                                               | Becken.                                                                                                         | Kind.                                                               | Lage.                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>65.</b><br>Pol.<br>7/8 67.   | Fran-<br>ziska<br>Chr.<br>36 J. | ?                                                                                                       | Platt.<br>Cv. = 3" 1—3"<br>= 8,5 cm.                                                                            | Knabe.                                                              | 2. Schiefelage<br>1. Unterart.                                                      |
| <b>66.</b><br>Pol.<br>17/8 68.  | Erne-<br>stine<br>W.<br>27 J.   | 3. Entb.,<br>1. mittelst<br>Zange,<br>2. Frühgeburt                                                     | Platt.<br>Cv. = 3" 1" = 8,3 cm.<br>Prom. hochstehend.                                                           | Knabe.                                                              | 1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                      |
| <b>67.</b><br>Pol.<br>9/11 71.  | Fran-<br>ziska<br>Qu.<br>37 J.  | 6. Entb.,<br>1mal Wendg.,<br>1mal Zange.                                                                | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3" 1" = 8,3 cm.<br>Prom. tiefstehend,<br>vord. Beckenw. nie-<br>drig, gut geneigt. | Mädchen.                                                            | 2. Schiefelage,<br>Vorfall des<br>rechten Arms.                                     |
| <b>68.</b><br>Pol.<br>9/8 71.   | Hen-<br>riette<br>G.<br>40 J.   | 12. Entb.,<br>4mal Abort,<br>sonst stets<br>operativ, ein-<br>mal mit Perf.<br>des nachfolg.<br>Kopfes. | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,1 cm.                                                                                    | Mädchen.                                                            | 2. Schiefelage<br>1. Unterart.                                                      |
| <b>69.</b><br>Pol.<br>2/4 67.   | Anna<br>St.<br>37 J.            | 3. Entb.,<br>1. Zange:<br>K. todt,<br>2. lange Ge-<br>burtsdauer,<br>normal.                            | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,1 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                              | Knabe.                                                              | 2. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                      |
| <b>70.</b><br>Klin.<br>6/1 67.  | Erne-<br>stine<br>W.<br>24 J.   | 3. Entb.,<br>sonst normal.                                                                              | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,1 cm.                                                                                    | Knabe,<br>Gw. 6 Pfd. 28 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 36,0<br>Qu. = 9,0 | 2. Schiefelage,<br>Vorfall der Na-<br>belschnur, des<br>1. Armes, des<br>1. Fusses. |
| <b>71.</b><br>Pol.<br>16/12 70. | Bertha<br>H.<br>27 J.           | 3. Entb.,<br>1. operativ?<br>2. Zange,<br>K. todt.                                                      | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,1 cm.<br>Prom. sehr tief, vord.<br>Beckenw. niedrig,<br>gut geneigt.                     | Knabe,<br>gross.                                                    | 2. Schiefelage<br>2. Unterart,<br>Vorfall einer<br>Hand.                            |

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.                  | Verlauf.                                                                                                                   | Ausgang<br>für                   |                                                  |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    |                                     |                                                                                                                            | Mutter.                          | Kind.                                            |
| ?                  | vor<br>2 Std.                       | Wendg., Extr. verzögert<br>durch schwieriges Lösen eines Armes<br>(zwischen Kopf u. Symph.).                               | normal.                          | stirbt<br>in partu.                              |
| 18 Std.            | vor<br>6 Std.                       | Wendg. leicht, Extr. des Kopfes<br>mässig schwer.                                                                          | normal.                          | tief asphyct.,<br>mit Mühe<br>wieder-<br>belebt. |
| etwa<br>18 Std.    | Blase<br>steht.                     | Sprengen der Blase, Wendg. leicht,<br>Austreibung spontan.                                                                 | Parametritis<br>mit<br>Genesung. | ante partum<br>gestorben,<br>macerirt.           |
| über<br>48 Std.    | seit<br>We-<br>hen-<br>be-<br>ginn. | Wendg. u. Extr. ziemlich leicht.                                                                                           | normal.                          | ante partum<br>gestorben.                        |
| 18 Std.            | vor<br>10 Std.                      | Wendg., Extr. schwierig wegen<br>Narbenstränge der Scheide in Folge<br>früherer Geburtstraumen.                            | normal.                          | stirbt<br>in partu.                              |
| 12 Std.            | vor<br>1 Std.                       | Wendg., Kind reitet auf Nabelschnur,<br>Extr. des Steisses und des Kopfes<br>durch Strictur des Muttermundes<br>erschwert. | normal.                          | stirbt<br>asphyct.                               |
| 3 Std.             | vor<br>2½<br>Std.                   | Wendg. u. Extr., Kopf schwer aber<br>schnell entwickelt.                                                                   | normal.                          | stirbt<br>in partu.                              |

| Num-<br>mer.                                                | Name<br>und<br>Alter.          | Anamnese.                                                                                                                            | Becken.                                                                                     | Kind.                   | Lage.                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>72.</b><br><br>Pol.<br><sup>6</sup> / <sub>4</sub> 67.   | Jo-<br>hanne<br>Fr.<br>39 J.   | 5. Entb.,<br>1. Zange:<br>K. todt,<br>2. spontan:<br>leb. klein. K.,<br>3. Querlage:<br>todtes K.,<br>4. Querlage:<br>leb. klein. K. | Platt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                          | Knabe,<br>schwächlich.  | 2. Schiefelage<br>1. Unterart.                               |
| <b>73.</b><br>Pol.<br><sup>5</sup> / <sub>6</sub> 67.       | Ve-<br>ronica<br>L.<br>38 J.   | 5. Entb.,<br>3 ersten spon-<br>tan, 4. Steiss-<br>lage: K. todt.                                                                     | Platt.<br>Cv. = fast 3"<br>= 8,0 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                  | Knabe.                  | 2. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Vorfall d. linken<br>Arms. |
| <b>74.</b><br><br>Pol.<br><sup>5</sup> / <sub>9</sub> 70.   | Jo-<br>hanne<br>B.<br>41 J.    | 4. Entb.,<br>2mal Zange,<br>1mal Wendg.<br>u. Zange:<br>K. todt,<br>1mal spontan,<br>Kinder stets<br>todt.                           | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 2" 10"<br>= 7,6 cm.                                            | Knabe.                  | 2. Querlage<br>2. Unterart.                                  |
| <b>75.</b><br>Pol.<br><sup>28</sup> / <sub>3</sub> 68.      | Chri-<br>stiane<br>G.<br>25 J. | 4. Entb.,<br>2 ersten spon-<br>tan, 3 mittelst<br>Perfor.                                                                            | Platt.<br>Cv. = 2" 10"<br>= 7,6 cm.                                                         | Mädchen.                | 1. Schiefelage<br>1. Unterart.                               |
| <b>76.</b><br>Pol.<br><sup>18</sup> / <sub>10</sub> 67.     | Elisa-<br>beth<br>M.<br>37 J.  | 5. Entb.,<br>sonst spon-<br>tan: schwäch-<br>liche Kinder.                                                                           | Platt.<br>Cv. = 2" 10"<br>= 7,6 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                   | Knabe.                  | 2. Schiefelage<br>1. Unterart<br>Vorfall des<br>linken Arms. |
| <b>77.</b><br><br>Pol.<br><sup>29</sup> / <sub>10</sub> 69. | Jo-<br>hanne<br>R.<br>39 J.    | 7. Entb.,<br>3 ersten:<br>Fusslagen,<br>K. todt,<br>4.: Frühgeb.:<br>— todt,<br>5. u. 6.:<br>Wendg. u.<br>Extr. — todt.              | Platt.<br>Cv. = 2" 10"<br>= 7,6 cm.<br>Prom. tief, vord.<br>Beckenw. sehr steil<br>u. hoch. | Mädchen,<br>sehr stark. | 2. Schiefelage<br>1. Unterart.                               |

| Geburts-<br>dauer.      | Blasen-<br>sprung.             | Verlauf.                                                                                                                                      | Ausgang<br>für                                                                  |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                         |                                |                                                                                                                                               | Mutter.                                                                         | Kind.                                            |
| 21 Std.                 | Wasser<br>noch<br>im<br>Uterus | Wendg. auf einen Fuss, Lösung eines<br>Armes (zwischen Kopf und Symph.)<br>schwer, Kopf tritt schräg ein, schwierige<br>Querstellung u. Extr. | normal.                                                                         | stirbt<br>in partu.                              |
| 8 $\frac{1}{2}$<br>Std. | vor<br>2 $\frac{1}{2}$<br>Std. | Wendg. u. Extr. des Rumpfes leicht,<br>Lösung der Arme und Entwicklung<br>des Kopfes schwer.                                                  | normal.                                                                         | tief asphyct.,<br>mit Mühe<br>wieder-<br>belebt. |
| ?                       | ?                              | Wendg. sehr schwer, sowohl wegen<br>Enge des Eingangs als auch wegen<br>Uteruscontraction, Extr. leicht.                                      | collabirt<br>in partu,<br>stirbt nach<br>3 Tagen an<br>Endometritis<br>septica. | ante partum<br>gestorben.                        |
| 33 Std.                 | vor<br>12 Std.                 | Wendg. und Extr. bis zum Kopfe<br>leicht, Entwicklung des Kopfes<br>mässig schwer.                                                            | normal.                                                                         | ante partum<br>gestorben.                        |
| 10 Std.                 | vor<br>10 Std.                 | Wendg. auf beide Füsse leicht, Ex-<br>traction des Kopfes schwer.                                                                             | normal.                                                                         | stirbt<br>in partu.                              |
| 8 Std.                  | vor<br>$\frac{1}{2}$ Std.      | Wendg., Extr. bis zum Kopfe schwer,<br>Entwicklung des Kopfes durch be-<br>deutendes räumliches Missverhältniss<br>enorm erschwert.           | normal.                                                                         | stirbt<br>in partu.                              |

| Num-<br>mer.                                                 | Name<br>und<br>Alter.        | Anamnese.                                                                                        | Becken.                                                                                                | Kind.                                                                   | Lage.                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>78.</b><br><br>Klin.<br><sup>29</sup> / <sub>11</sub> 65. | Au-<br>guste<br>M.<br>23 J.  | 3. Entb.                                                                                         | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 2" 10"<br>= 7,6 cm.                                                       | Knabe.<br>Gw. 4 Pfd. 3 L.<br>Künstl.<br>Frühgeburt.                     | 2. Schiefelage<br>mit Vorfall d.<br>linken Hand.                                     |
| <b>79.</b><br><br>Pol.<br><sup>29</sup> / <sub>2</sub> 68.   | Ro-<br>salie<br>M.<br>37 J.  | 6. Entb.,<br>sonst lang-<br>dauernd,<br>spontan.                                                 | Platt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.                                                                        | Mädchen.<br>ausgetragen,<br>macerirt.                                   | 2. Schiefelage<br>1. Unterart.                                                       |
| <b>80.</b><br><br>Pol.<br><sup>18</sup> / <sub>8</sub> 68.   | Caro-<br>line<br>W.<br>38 J. | 9. Entb.,<br>2mal perf.,<br>2mal künstl.<br>Frühgeburt,<br>2mal Zange<br>— todt.                 | Platt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>Prom. hoch, sehr<br>vorspringend, vord.<br>Beckenw. steil.          | Knabe.<br>K. = 39,0<br>Sch. = 43,0<br>Bit. Qu. = 9,0<br>Bip. Qu. = 10,5 | 1. Schiefelage<br>1. Unterart.                                                       |
| <b>81.</b><br><br>Pol.<br><sup>3</sup> / <sub>2</sub> 71.    | Jo-<br>hanna<br>W.<br>34 J.  | 3. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd, nor-<br>mal, 2. lang-<br>dauernd,<br>spontan,<br>todte Frucht. | Platt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>Prom. tiefstehend,<br>vord. Beckenw.<br>mittelhoch, gut<br>geneigt. | Knabe.                                                                  | 2. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Vorfall d. linken<br>Armes und der<br>Nabelschnur. |
| <b>82.</b><br><br>Klin.<br><sup>19</sup> / <sub>7</sub> 68.  | Erne-<br>stine J.<br>28 J.   | 4. Entb.,<br>2. normal,<br>3. Schädel<br>lage, Zange,<br>Kind vor der<br>Geb. gestorb.           | Platt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>Prom. sehr hoch,<br>vord. Beckenw. hoch<br>und steil.               | Knabe.<br>Gw. 6 Pfd. 9 L.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 9,0      | 1. Schiefelage<br>mit Vorfall der<br>Nabelschnur und<br>eines Armes.                 |
| <b>83.</b><br><br>Pol.<br><sup>6</sup> / <sub>8</sub> 67.    | J. G.<br>34 J.               | 4. Entb.,<br>1. normal,<br>2. Querlage,<br>Wendg.,<br>K. todt,<br>3. Zange, todt.                | Platt.<br>Cv. = 2" 9" = 7,4 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                  | Mädchen.                                                                | 1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                       |
| <b>84.</b><br><br>Pol.<br><sup>28</sup> / <sub>4</sub> 68.   | Au-<br>guste<br>N.<br>30 J.  | 5. Entb.,<br>3 spontan,<br>4. Querlage.                                                          | Platt.<br>Cv. = 2" 8" = 7,2 cm.                                                                        | Mädchen.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 34,0                                    | 1. Schiefelage<br>1. Unterart,<br>Vorfall des rech-<br>ten Arms.                     |

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                 | Ausgang<br>für                          |                                           |
|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |                    |                                                                                                                                                                          | Mutter.                                 | Kind.                                     |
| ?                  | vor<br>24 Std.     | Wendg. auf einen Fuss, Extr. des Rumpfes leicht, Kopf manuell nicht zu entwickeln; während man zur Perfor. schreitet, wird der Kopf durch die Wehen allein ausgetrieben. | normal.                                 | ante partum gestorben.                    |
| 6 Std.             | vor<br>1½ Std.     | Wendg. u. Extr. ziemlich leicht.                                                                                                                                         | normal.                                 | ante partum gestorben.                    |
| ?                  | ?                  | Wendg. u. Extr. bis zum Kopf leicht, Kopf erst nach Perfor. entwickelt.                                                                                                  | normal.                                 | perforirt.                                |
| 8 Std.             | vor<br>3 Std.      | Wendg., Austreibung des Rumpfes spontan, Extr. des Kopfes mässig schwer.                                                                                                 | Pel-<br>ve-<br>peritonitis,<br>Heilung. | leicht<br>asphyct.,<br>wieder-<br>belebt. |
| 8 Std.             | vor<br>5 Std.      | Wendg. bei nicht ganz eröffnetem Muttermunde, Extr. des Kopfes schwer.                                                                                                   | normal.                                 | stirbt<br>in partu.                       |
| 13 Std.            | vor<br>6 Std.      | Wendg. u. Extr., Lösen der Arme u. Entwicklung des Kopfes schwer.                                                                                                        | normal.                                 | stirbt<br>in partu.                       |
| 11 Std.            | vor<br>2 Std.      | Wendg., Extr. unter Mitwirkung kräftiger Wehen leicht.                                                                                                                   | normal.                                 | normal.                                   |

| Num-<br>mer.                                                | Name<br>und<br>Alter.       | Anamnese.                                                                                                                                                         | Becken-<br>maass / Kind.                                                                                                                      | Lage.                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>85.</b><br><br>Pol.<br><sup>5</sup> / <sub>1</sub> 68.   | Su-<br>sanna<br>R.<br>35 J. | 7. Entb.,<br>3 ersten spon-<br>tan, lang-<br>dauernd,<br>4. Nabel-<br>schnurvorfall<br>— todt,<br>5. Kopflage<br>— todt,<br>6. Vorfall<br>einer Hand<br>— lebend. | Platt.<br>Cv.=2"8"=7,2 cm.<br>D. Sp. = 24,0<br>D. Cr. = 23,5                                                                                  | Knabe<br>von normaler<br>Grösse.<br><br>2. Schiefelage<br>2. Unterart,<br>Vorfall der Na-<br>belschnur u. d.<br>rechten Arms |
| <b>86.</b><br><br>Pol.<br><sup>16</sup> / <sub>2</sub> 68.  | Selma<br>Sch.<br>40 J.      | 10. Entb.,<br>sonst stets<br>spontan nach<br>4-5ständiger<br>Geburtsdauer                                                                                         | Platt.<br>Cv.=2"8"=7,2 cm.<br>Prom. sehr tief.                                                                                                | Knabe,<br>kräftig.<br>K. = 36,0<br>Sch. = 35,0<br><br>1. Querlage<br>1. Unterart.                                            |
| <b>87.</b><br><br>Pol.<br><sup>20</sup> / <sub>11</sub> 69. | Au-<br>guste<br>P.<br>36 J. | 5. Entb.,<br>sonst lang-<br>dauernd,<br>spontan.                                                                                                                  | Platt asymmetrisch.<br>Cv.=3"2"=8,5 cm.<br>D. Sp. = 25,5<br>D. Cr. = 25,0<br>Prom. hoch, etwas<br>nach links deviirt,<br>vord. Beckenw. hoch. | Knabe,<br>sehr kräftig.<br>Gew. 8 Pfd.<br><br>1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                 |
| <b>88.</b><br><br>Pol.<br><sup>17</sup> / <sub>8</sub> 67.  | Ro-<br>salie<br>H.<br>26 J. | 2. Entb.,<br>1.: macerirtes<br>Kind.                                                                                                                              | Trichterförmig all-<br>gemein verengtes<br>Becken.<br>(Die Enge erst wäh-<br>rend der Geburt er-<br>kannt.)                                   | Mädchen.<br><br>2. Schiefelage<br>2. Unterart<br>mit Vorfall der<br>Nabelschnur und<br>des 1. Armes.                         |
| <b>89.</b><br><br>Pol.<br><sup>30</sup> / <sub>10</sub> 67. | Emilie<br>H.<br>23 J.       | 1. Entb.                                                                                                                                                          | Gleichmässig allge-<br>mein verengt.<br>Cv.=3"5"=9,2 cm.                                                                                      | Knabe,<br>nicht kräftig.<br><br>1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                                               |
| <b>90.</b><br><br>Pol.<br><sup>30</sup> / <sub>3</sub> 70.  | Pauline P.<br>24 J.         | 3. Entb.,<br>1. lang-<br>dauernd,<br>2. Frühgeb.                                                                                                                  | Allgemein verengt.<br>Cv.=3"4"=9,0 cm.<br>Prom. sehr hoch,<br>vord. Beckenw. hoch<br>u. steil.                                                | Knabe,<br>Frühgeburt<br>von<br>25 Wochen.<br><br>1. Schiefelage<br>2. Unterart.                                              |

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                                     | Ausgang<br>für |                                                                      |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
|                    |                    |                                                                                                                                                                                              | Mutter.        | Kind.                                                                |
| 5 Std.             | vor<br>1½<br>Std.  | Wendg. u. Extr. bis zum Kopfe leicht,<br>Entwicklung des Kopfes mässig<br>schwer.                                                                                                            | normal.        | ante partum<br>gestorben.                                            |
| 9 Std.             | ?                  | Wendg. auf einen Fuss leicht. Aus-<br>treibung d. Rumpfes (Rücken hinten)<br>spontan, Arme schwer zu lösen, Kopf<br>mit nach vorn gekehrtem Gesichte<br>extrahirt.                           | normal.        | stirbt<br>in partu.                                                  |
| 12 Std.            | vor<br>4 Std.      | Wendg. leicht, Sinken des Fötal-<br>pulses, Entwicklung des Kopfes sehr<br>schwer wegen Enge des Eingangs.                                                                                   | normal.        | stirbt<br>asphyct.<br>Tiefe Impres-<br>sion u. Fissur<br>am Schädel. |
| ?                  | vor<br>2 Std.      | Wendg. schwierig wegen Hänge-<br>bauch und Lage der Füße nach vorn,<br>Extraction durch Enge des Ausgangs<br>und Contraction des Uterus erschwert.                                           | normal.        | ante partum<br>gestorben.                                            |
| 9½<br>Std.         | vor<br>1½<br>Std.  | Erfassen der nach vorn gekehrten<br>Füße schwierig, Extraction durch<br>Strictur des Muttermundes und noch<br>mehr durch engen Scheideneingang<br>verzögert, daher Application der<br>Zange. | normal.        | stirbt<br>in partu.                                                  |
| 24 Std.            | vor<br>3 Std.      | Wendg. u. Extr. durch Strictur des<br>innern Muttermundes erschwert.                                                                                                                         | normal.        | ante partum<br>gestorben.                                            |

| Num-<br>mer.                    | Name<br>und<br>Alter.      | Anamnese.                                                                    | Becken.                                                                                                                                                                      | Kind.                                                               | Lage.                          |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>91.</b><br>Pol.<br>12/7 68.  | Alber-<br>tine B.<br>35 J. | 5. Entb.,<br>sonstspontan.                                                   | Gleichmässig allge-<br>mein verengt.<br>Cv.=3"2"=8,5 cm.                                                                                                                     | Mädchen.                                                            | 2. Schiefelage<br>2. Unterart. |
| <b>92.</b><br>Pol.<br>7/5 68.   | Marie<br>Sch.<br>30 J.     | 2. Entb.,<br>1. mittelst<br>Zange, weil<br>Kopflänge im<br>Ausgang<br>stand. | Gleichmässig allge-<br>mein verengt.<br>Cv.=3"2"=8,5 cm.                                                                                                                     | Knabe,<br>ziemlich<br>kräftig.                                      | 2. Schiefelage<br>2. Unterart. |
| <b>93.</b><br>Klin.<br>6/12 67. | Marie<br>S.<br>24 J.       | 1. Entb.                                                                     | Platt, wahrschein-<br>lich allgemein<br>verengt.<br>Cv.=2"10"=7,6 cm.<br>D. Sp. = 19,5<br>D. Cr. = 24,0<br>Dopp. Prom., 1. sehr<br>hoch, 2. tief, vord.<br>Wand hoch, steil. | Knabe.<br>Gw. 6 Pfd. 14 L.<br>K. = 36,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 9,5 | 1. Schiefelage.                |

#### IV. Becken-

|                                  |                       |                                                               |                                                                                                           |                                                                    |                               |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>94.</b><br>Pol.<br>16/7 69.   | Rosina<br>R.<br>34 J. | 7. Entb.,<br>2mal Zange,<br>1mal Wendg.,<br>sonst<br>spontan. | Platt.<br>Doppeltes Prom.<br>C. d. zum 1. = 12,0<br>zum 2. = 10,5<br>Vord. Beckenw. hoch<br>u. steil.     | Knabe.                                                             | 1. Steisslage<br>2. Unterart. |
| <b>95.</b><br>Pol.<br>31/12 67.  | Minna<br>K.<br>34 J.  | 7. Entb.,<br>5 spontan,<br>1 mit Zange.                       | Platt.<br>Cv.=3"2"=8,5 cm.                                                                                | Knabe,<br>kräftig.                                                 | 1. Steisslage.                |
| <b>96.</b><br>Klin.<br>15/12 69. | He-<br>lene F.        | 1. Entb.,<br>Kyphotische<br>Person.                           | Platt.<br>Cv.=3"2"=8,5 cm.<br>D. Sp. = 25,0<br>D. Cr. = 22,0<br>Kreuzbein enorm<br>breit, fast senkrecht. | Knabe.<br>Gw. 5 Pfd. 6 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 35,0<br>Qu. = 8,5 | 1. Steisslage.                |

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung. | Verlauf.                                                                                                                                                                                                | Ausgang<br>für                                        |                                                                                         |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                    |                                                                                                                                                                                                         | Mutter.                                               | Kind.                                                                                   |
| ?                  | vor<br>27 Std.     | Wendg. u. Extr. bis zum Kopfe leicht,<br>Kopf wegen Beckenenge schwer<br>extrahirt.                                                                                                                     | normal.                                               | tief asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                                    |
| 16 Std.            | vor<br>13 Std.     | Wendg. u. Extr. bis zum Kopfe leicht,<br>Kopf muss wegen Enge des Ausgangs<br>mit Zange entwickelt werden.                                                                                              | normal.                                               | asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                                         |
| 32 Std.            | vor<br>1 Std.      | Wendg. auf beide Füße und Extr.<br>des Rumpfes leicht, die Beckenenge<br>erschwert die Entwicklung des Kopfes<br>sehr, durch die enge Rinne gelingt<br>sie erst nach tiefen seitlichen In-<br>cisionen. | Endometritis,<br>Endocolpitis<br>diphth.<br>Genesung. | stirbt<br>in partu.<br>Splitterbruch<br>an der linken<br>Hinter-<br>haupts-<br>schuppe. |

## endenlagen.

|                 |                        |                                                                        |                                                                                                        |                                                  |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| etwa<br>10 Std. | vor<br>2½<br>Std.      | Rumpf spontan ausgetrieben, Schul-<br>tern und Kopf leicht entwickelt. | normal.                                                                                                | ante partum<br>gestorben.                        |
| 22 Std.         | vor<br>11 Std.         | Austreibung bis zum Kopfe spontan,<br>Kopf leicht entwickelt.          | normal.                                                                                                | ante partum<br>gestorben.                        |
| ?               | vor<br>langer<br>Zeit. | Extraction docendi causa, leicht u.<br>schnell.                        | Parametritis,<br>Oberschen-<br>kelabscesse.<br>Ins Hospital<br>transferirt,<br>Ausgang un-<br>bekannt. | tief asphyct.,<br>mit Mühe<br>wieder-<br>belebt. |

| Num-<br>mer.                                                 | Name<br>und<br>Alter.        | Anamnese.                                                                                             | Becken.                                                                                                                    | Kind.                                                                                             | Lage.                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>97.</b><br><br>Klin.<br><sup>9</sup> / <sub>2</sub> 68.   | Jo-<br>hanne<br>R.<br>22 J.  | 2. Entb.,<br>1. normal,<br>kleines Kind.                                                              | Platt.<br>Cv. = 3" 1—2"<br>= 8,3 cm.<br>Prom. sehr tief, vord.<br>Beckenw. niedrig,<br>gut geneigt.                        | Mädchen.<br>Gw. 4 Pfd. 22 L.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 30,0<br>Qu. = 8,0                             | 2. unvoll-<br>kommene Fuss-<br>lage. |
| <b>98.</b><br><br>Pol.<br><sup>29</sup> / <sub>4</sub> 71.   | Caro-<br>line<br>W.<br>32 J. | 1. Entb.                                                                                              | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 3" 2" = 8,5 cm.<br>Prom. tiefstehend,<br>vord. Beckenw. nie-<br>drig, gut geneigt.            | Knabe.                                                                                            | 1. Steisslage<br>1. Unterart.        |
| <b>99.</b><br><br>Pol.<br><sup>24</sup> / <sub>11</sub> 67.  | Anna<br>H.<br>33 J.          | 4. Entb.,<br>sonst normal.                                                                            | Platt.<br>Cv. = 3" 1" = 8,3 cm.,<br>Prom. tiefstehend.                                                                     | Knabe.                                                                                            | 2. Knielage.                         |
| <b>100.</b><br><br>Pol.<br><sup>4</sup> / <sub>9</sub> 68.   | Caro-<br>line<br>W.<br>31 J. | 1. Entb.                                                                                              | Platt.<br>Cv. = 3" 1" = 8,3 cm.                                                                                            | Mädchen.<br>K. = 34,0<br>Sch. = 34,0                                                              | 1. Fusslage.                         |
| <b>101.</b><br><br>Pol.<br><sup>12</sup> / <sub>4</sub> 68.  | Beate<br>H.<br>30 J.         | 1. Entb.                                                                                              | Platt.<br>Cv. = 3" 1" = 8,3 cm.                                                                                            | Mädchen.                                                                                          | 2. Steisslage.                       |
| <b>102.</b><br><br>Pol.<br><sup>11</sup> / <sub>3</sub> 67.  | Caro-<br>line<br>B.<br>23 J. | 1. Entb.                                                                                              | Platt.<br>Cv. = 3" 8" = 1 cm.<br>Prom. tiefstehend.                                                                        | Mädchen,<br>sehr<br>entwickelt.                                                                   | 2. Steisslage.                       |
| <b>103.</b><br><br>Klin.<br><sup>2</sup> / <sub>3</sub> 72.  | Clara<br>P.<br>27 J.         | 3. Entb.,<br>1. Perf. u.<br>Hakenextr.,<br>2. künstl.<br>Frühgeburt:<br>kleines Kind,<br>leichte Geb. | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = fast 3" = 8,0 cm.<br>Prom. tief, scharf<br>vorspringend, vord.<br>Beckenw. ziemlich<br>steil. | Mädchen.<br>Gw. 4 Pfd. 15 L.<br>K. = 33,0<br>Sch. = 34,0<br>Qu. = 9,5<br>Künstl. Früh-<br>geburt. | 1. Steisslage<br>1. Unterart.        |
| <b>104.</b><br><br>Klin.<br><sup>30</sup> / <sub>1</sub> 71. | Louise<br>B.<br>22 J.        | 1. Entb.                                                                                              | Platt.<br>Cv. = 2" 11" = 7,8 cm.<br>Prom. tiefstehend,<br>scharf vorragend,<br>vord. Beckenw. nie-<br>drig, gut geneigt.   | Knabe.<br>Gw. 6 Pfd. 10 L.<br>K. = 36,0<br>Sch. = 37,0<br>Qu. = 10,0                              | 1. unvoll-<br>kommene Fuss-<br>lage  |

| Geburts-<br>dauer.                     | Blasen-<br>sprung.                           | Verlauf.                                                                                                                                                                          | Ausgang<br>für                         |                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                              |                                                                                                                                                                                   | Mutter.                                | Kind.                                                                          |
| 9 Std.                                 | eben<br>er-<br>folgt.                        | Austreibung bis zum Nabel spontan;<br>wegen starker Spannung der mehr-<br>fach umschlungenen Nabelschnur Ex-<br>traction: leicht.                                                 | normal.                                | asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                                |
| 22 Std.                                | ?                                            | Wegen Sinken des Fötalpulses Extr.;<br>dieselbe sehr schwierig, beide Arme<br>heraufgeschlagen.                                                                                   | normal.                                | normal.                                                                        |
| 3 Std.                                 | Blase<br>steht.                              | Nachdem wegen Wehenschwäche die<br>Blase gesprengt worden, wird ein<br>Fuss herabgeleitet, weiterer Verlauf<br>spontan und leicht.                                                | normal.                                | normal.                                                                        |
| 12 Std.                                | vor<br>3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Std. | Austreibung bis zu den Schultern<br>normal, die darauf folgende Extr.<br>leicht.                                                                                                  | normal.                                | normal.                                                                        |
| über<br>3 Tage.                        | ?                                            | Extr. des Kopfes wegen Wehen-<br>schwäche durch den Eingang leicht,<br>breiter Damm macht Zangenentwick-<br>lung nothwendig.                                                      | normal.                                | tief asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                           |
| etwa<br>16 Std.                        | vor<br>10 Std.                               | Nach Austritt des Steisses wegen<br>Enge des Beckens Extr., schwieriges<br>Lösen der Arme, Kopf wegen Enge<br>des Eingangs und Stricture des Mut-<br>termundes schwer entwickelt. | normal.                                | stirbt<br>in partu.                                                            |
| 19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>Std. | eben<br>er-<br>folgt.                        | Nach Durchtritt des Steisses wegen<br>Verlangsamung des Nabelschnur-<br>pulses Extr., dieselbe sehr leicht.                                                                       | leichte<br>Erkrankung<br>mit Genesung. | asph., wieder-<br>belebt, stirbt<br>bald darauf<br>an Atelektase<br>der Lunge. |
| 4 Std.                                 | vor<br>2 Std.                                | Extr. des Rumpfes leicht, des Kopfes<br>wegen Enge schwer.                                                                                                                        | normal.                                | leicht<br>asphyct.,<br>wieder-<br>belebt.                                      |

| Num-<br>mer.                                                  | Name<br>und<br>Alter.         | Anamnese.                                | Becken.                                                                                                                                | Kind.                                                                                           | Lage.                                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>105.</b><br><br>Pol.<br><sup>6</sup> / <sub>10</sub> 71.   | Bertha<br>S.<br>26 J.         | 1. Entb.                                 | Platt, rhachitisch.<br>Cv. = 2" 11"<br>= 7,75 cm.<br>Dopp. Prom., wahres<br>hoch, vord. Beckenw.<br>hoch u. steil.                     | Mädchen.                                                                                        | 1. Unterart.<br>2. vollkommen<br>Fusslage. |
| <b>106.</b><br><br>Pol.<br><sup>12</sup> / <sub>6</sub> 69.   | Anna<br>W.<br>24 J.           | 6. Entb.,<br>sonst stets<br>langdauernd. | Gleichmässig allge-<br>mein verengt.<br>Cv. = 3" = 8,0 cm.<br>Prom. sehr hoch,<br>spitz vorragend,<br>vord. Beckenw. hoch<br>u. steil. | Knabe.                                                                                          | 1. Steisslage<br>2. Unterart.              |
| <b>107.</b><br><br>Klin.<br><sup>14</sup> / <sub>12</sub> 71. | Anna<br>N.<br>27 J.           | 2. Entb.,<br>1. mit Zange.               | Rhachitisch, platt,<br>allgemein verengt.<br>Cv. = 2" 8" = 7,2 cm.                                                                     | Mädchen.<br>Gw. 4 Pfd. 10 L.<br>K. = 32,0<br>Sch. = 32,0<br>Qu. = 9,0<br>Künstl.<br>Frühgeburt. | 2. Steisslage.                             |
| <b>108.</b><br><br>Klin.<br>66/67.                            | Erne-<br>stine<br>S.<br>28 J. | 1. Entb.<br>(Vgl. Nr. 52.)               | Coxalgisch asymme-<br>trisch rechtsseitig u.<br>allgemein verengt.                                                                     | Mädchen.<br>Gw. 5 Pfd. 7 L.<br>K. — 32,0<br>Sch. = 33,0<br>Künstl.<br>Frühgeburt.               | 2. Steisslage.                             |

| Geburts-<br>dauer. | Blasen-<br>sprung.    | Verlauf.                                                                                                                                                             | Ausgang<br>für |                                                            |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                       |                                                                                                                                                                      | Mutter.        | Kind.                                                      |
| 17 Std.            | eben<br>er-<br>folgt. | Da Mutter fiebert, der Steiss nicht eintritt, so wird extr. Die Entwicklung ist schwierig, bes. die Lösung der heraufgeschlagenen Arme. Kind reitet auf Nabelschnur. | normal.        | stirbt<br>asphyct.<br>Tiefe Im-<br>pression am<br>Schädel. |
| 4 Std.             | vor<br>4 Std.         | Ungeschickte Extr. von Seiten des Praktikanten: Rumpf zu schnell, Kopf zu langsam entwickelt.                                                                        | normal.        | stirbt<br>asphyct.                                         |
| 2½<br>Std.         | —                     | Wegen Sistirung des Fötalpulses Extr. leicht und schnell.                                                                                                            | normal.        | normal.                                                    |
| —                  | eben<br>er-<br>folgt. | Nach Durchtritt des Steisses mässig schwere Extr.: Kopf tritt im zweiten schrägen Durchmesser durch den Eingang, Rücken vorn.                                        | normal.        | stirbt<br>asphyct.                                         |

## F a c i t

sämmtlicher Fälle von Wendung auf die Füße  
bei engem Becken.

Es wurde gewendet und mit zwei Ausnahmen extrahirt in 93 Fällen, davon waren in 34 die Kinder lebend geboren, in 39 starben sie während oder bald nach der Geburt, 20 Früchte waren vorher abgestorben, 2mal musste der Kopf behufs Vollendung der Umdrehung perforirt werden, 7mal wurde die Perforation des nachfolgenden Kopfes nothwendig, 1mal wurde letzterer mittelst des scharfen Hakens, 2mal mittelst der Kopfzange extrahirt.

Mütter starben bald nach der Geburt 15, die meisten in Folge von Complicationen, wie Uterusruptur, Placenta profunda und Metrorrhagie, Nephritis, Pneumonie u. a., dreimal anscheinend nur in Folge sehr schwieriger manueller Extraction, ausserdem machten 8 Mütter Wochenbettkrankheiten durch, die sich sämmtlich auf Complicationen zurückführen lassen.

Nach den Indicationen vertheilen sich in Bezug auf den Ausgang die Wendungsfälle folgendermassen:

1. Kopflagen ohne Complication (wegen andauernd ungünstiger Kopfstellung): 16, darunter 7 Kinder lebend, 9 in Folge der Geburt gestorben.
2. Kopflagen mit Complication (18mal wegen Vorfall der Nabelschnur oder kleiner Theile, 18mal wegen Erkrankung der Mutter): 36, davon 15 Kinder lebend, 14 in Folge der Geburt, 7 vorher gestorben.
3. Quer- und Schief lagen: 41, davon 12 lebend, 16 in Folge der Geburt und 13 vorher gestorben.

Nach der Art und dem Grade der Beckenenge vertheilen sich die Fälle in folgender Weise:

### I. Gradverengte Becken:

74, davon 29 lebend geboren, 29 in Folge der Geburt, 16 vorher gestorben.

- a. Cv. = 3'' 4—6''' : 12, davon 8 lebend geboren, 4 vorher gestorben.

b. Cv. = 3''—3'3''': 33, davon 10 lebend, 17 in Folge der Geburt, 6 vorher gestorben.

c. Cv. = 2'6'''—3'' (excl.): 29, davon 11 lebend geboren, 12 in Folge der Geburt, 6 vorher gestorben.

Die Kindesgrösse verhielt sich folgendermassen:

a. Cv. = 3'4—6''': unter 8 lebend geborenen sind 4 grössere, 1 mittelgrosses, 1 kleines Kind.

b. Cv. = 3''—3''': Unter 10 lebend geborenen sind 3 grössere, 3 mittelgrosse Kinder; — unter 17 in Folge der Geburt gestorbenen sind 8 grössere, 1 mittelgrosses, 1 kleineres Kind.

c. Cv. unter 3'': unter 11 lebenden sind 2 grössere, 2 mittelgrosse, 3 kleinere; — unter 12 in Folge der Geburt gestorbenen sind 6 grössere, 1 mittelgrosses, 2 kleinere Kinder.

## II. Allgemein gleichmässig zu enge Becken:

4 (Quer- und Schiefagen), davon 2 lebend geboren, 1 in Folge der Geburt, 1 vorher gestorben. Von den beiden lebenden war ein Kind mittelgross.

## III. Trichterförmig verengte Becken:

1 (Schiefage) vor der Geburt gestorben.

## IV. Allgemein, vorzugsweise gradverengte Becken:

9 (2 Kopflagen ohne Complic., 6 mit Complic., 1 Schiefage), davon 1 lebend geboren, 7 in Folge der Geburt, 1 vorher gestorben. Das lebendgeborene Kind gehörte zu den kleineren.

## V. Asymmetrische Becken:

5 (1 Kopflage ohne Complic., 3 mit Complic., 1 Schiefage), darunter 2 coxalgisch schrägverengte, 3 platte asymmetrisch. Von den Kindern wurde bei ersteren 1 lebend geboren (künstliche Frühgeburt), 1 wurde perforirt; bei den letzteren wurde 1 lebend geboren, 1 starb während der Operation, 1 vor der Geburt.

---

### Die Beckenendenlagen

ergeben folgendes Resultat:

Bei 15 Geburten wurden 8 Kinder lebend geboren, 5 starben während oder bald nach der Geburt, 2 vorher. Einmal wurde die Extraction des Kopfes mittelst der Zange nothwendig. Von den Müttern starb eine nach einer leichten Geburt (künstliche Frühgeburt) an Endometritis septica.

Nach der Beckenform vertheilen sich die Resultate in folgender Weise:

I. Gradverengte B.: 12 Geburten, in 7 wurden die Kinder lebend, in 3 sterbend geboren, 2 waren vorher abgestorben.

a. Cv. 3''4—6''': 1 vor der Geburt gestorben.

b. Cv. 3''—3''3''': 8, davon 6 lebend, 1 in Folge der Geburt, 1 vorher gestorben.

c. Cv. unter 3'': 3, davon 1 lebend, 2 in Folge der Geburt gestorben.

II. Gleichmässig allgemein zu enge B.: 1 während der Geburt gestorben.

III. Allgemein vorzugsweise gradverengte B.: 1 lebend geboren (kleine Frucht).

IV. Asymmetrische B.: 1 (coxalgisch schrägverengt), das Kind starb in Folge der Geburt.

---

Bevor wir daran gehen, aus dem Ergebniss der Wendung und Extraction Schlüsse zu ziehen, müssen wir uns den Einfluss mancher Complicationen auf den Verlauf und den Ausgang klar machen, da man uns sonst einwenden könnte, der Erfolg sei durch Nebenumstände wesentlich modificirt und darum nicht zu verwerthen.

Dass eine Frucht mit Vorfall der Nabelschnur oder in Schiefelage eine schlechtere Prognose hat als eine andere unter sonst gleichen, aber nicht complicirten Verhältnissen, ist ganz selbstverständlich. Wenn jedoch beim Beginne der Wendung ein normaler Fötalpulss constatirt worden, so müssen wir den Ausgang einzig und allein aus dem Operationsverlauf erklären. Um die einzelnen Complicationen, welche das Ergebniss hätten

verschlimmern können, durchzugehen, so hat zwar irreponibler Vorfall der Nabelschnur 18mal die Wendung indicirt, 13mal jedoch mit glücklichem Erfolge, nur 5 der Früchte fanden ihren Tod, sämmtlich während einer mühsamen Extraction. Ferner könnte man uns beschuldigen, in zahlreichen Fällen viel zu spät, nachdem das Fruchtwasser schon lange abgeflossen, operirt zu haben, zu einer Zeit, wo die Manipulation im wasserleeren tetanisirten Uterus Mutter und Kind direct und indirect während der Extraction geschädigt hätte. In wie weit dies für die Mutter zutrifft, werden wir im weiteren Verlauf dieser Abhandlung würdigen; die Frucht könnte dadurch höchstens in zwei Fällen zu Grunde gegangen sein (S. Nr. 46, 61). Die Alteration, die hierdurch das Gesamtergebnis erfährt, ist von geringer Bedeutung.

Um nunmehr die Chancen für die Frucht bei Geburten mit vorangehendem Kopfe gegenüber den mittelst Wendung und Extraction beendeten überblicken zu können, stelle ich in folgender Tabelle sämmtliche Fälle von Kopfgeburten bei Beckenge, sowohl die expectativ als die operativ behandelten zusammen.

| Becken.                     | Gesammtzahl. | spontan         |      |       | Zange.          |      |       | Perforation. |
|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-------|-----------------|------|-------|--------------|
|                             |              | Zahl der Fälle. | leb. | totd. | Zahl der Fälle. | leb. | totd. |              |
| Gradverengt.                |              |                 |      |       |                 |      |       |              |
| Cv. 3" 4—6"                 | 67           | 60              | 52   | 8     | 7               | 5    | 2     | —            |
| Cv. 3"—3"3"                 | 157          | 121             | 99   | 22    | 19              | 13   | 6     | 17           |
| Cv. 2"6"—3"                 | 43           | 25              | 19   | 6     | 7               | 4    | 3     | 11           |
| Summa                       | 267          | 206             | 170  | 36    | 33              | 22   | 11    | 28           |
| Allg. gleichmässig verengt. | 31           | 14              | 11   | 3     | 12              | 9    | 3     | 5            |
| Trichterförmig verengt.     | 7            | 3               | 2    | 1     | 3               | 3    | —     | 1            |
| Allgem. zu eng platt.       | 11           | 6               | 5    | 1     | 1               | 1    | —     | 4            |
| Asymmetrisch.               | 6            | 4               | 4    | —     | 1               | 1    | —     | 1            |
| Total-Summe.                | 322          | 233             | 192  | 41    | 50              | 36   | 14    | 39           |

Werfen wir einen vergleichenden Blick auf die Statistik der Wendung, so zeigt sich ein auffälliger Vorthail zu Gunsten der Geburten mit vorangehendem Kopfe und zwar durchgehends für jede Beckenart. Uns bleibt demnach trotz der 11 Kinder, welche Schroeder und Hoening unter 14 Wendungen gerettet haben, kein Zweifel, dass wir in Rücksicht auf die Erhaltung der Frucht kaum jemals prophylactisch wenden werden.

---

Unter den Beckenformen sind es hauptsächlich die allgemein verengten jeder Art, welche sich zur Wendung am wenigsten eignen. Es wird dies von den Autoren mit ziemlicher Uebereinstimmung, selbst von Seiten der eifrigsten Vertheidiger der Wendung zugestanden. Unsere bezüglichlichen Erfolge sind ebenfalls nicht dazu angethan, diesen Erfahrungssatz umzustossen. Das ungünstige Resultat ergab die Wendung bei allgemein vorzugsweise gradverengten Becken: unter 8 Fällen einen einzigen glücklichen Ausgang! Der Grund der Unzulässigkeit der Wendung bei diesen Beckenformen wird in den Lehrbüchern genügend erörtert.

Die nur in der Conjugata verengten Becken geben die relativ beste Prognose.

Was das asymmetrische Becken betrifft, so sind wir noch nicht im Stande, zur Frage der Wendung Stellung zu nehmen. Soviel ist sicher, das wegen der geringen Dimension der Distantia sacro cotyloidea der engern Seite derjenige Theil des Beckens, welcher von ihr nach aussen liegt, für den Durchtritt des Kopfes als nicht existirend zu betrachten ist, dass demnach der längere schräge Durchmesser zur Förderung des Geburtsvorganges nichts beiträgt. — Zur Illustrirung der Martin'schen Indication, wonach bei schrägverengtem Becken die Wendung zu empfehlen sei, sobald der Kopf der engeren Beckenhälfte aufliegt, weil man es in der Hand habe, den dicken Hinterkopf durch den weiteren Beckenraum zu leiten, mögen folgende Fälle der vorliegenden Sammlung dienen:

In Nr. 50 steht der Kopf in ungünstiger Stellung auf der weiteren Beckenhälfte, passirt bei der Extraction denselben

Beckenraum, die Pfeilnaht im kürzeren schrägen Durchmesser, Stirn vorn, Occiput hinten. Ferner 52: Vor der Wendung steht der Kopf auf der engeren Beckenhälfte, Pfeilnaht zwischen querm und kürzerem schrägem Durchmesser, Rücken nach vorn; nach der Wendung geht er genau durch den kürzeren schrägen Durchmesser, wiederum Hinterhaupt nach vorn gerichtet. Bei einer vorausgegangenen Steissgeburt derselben Frau war der Kopf ebenso durchgetreten, und bei einer späteren spontanen Kopfgeburt passirte der Schädel den Eingang in derselben Weise.

---

Wenn uns die Vergleichung der Statistik auf die Seite der Gegner der prophylactischen Wendung drängt, so könnte uns vielleicht das Ergebniss der Anamnese eines Anderen belehren. In der That treffen wir gleich in Nr. 7 auf einen Fall, wo eine Frau von einem sehr kräftigen Knaben durch Wendung und Extraction leicht und glücklich entbunden wird, nachdem eine vorausgegangene Schädelgeburt nur durch Perforation hat beendet werden können. Ebenso spricht Nr. 46 zu Gunsten der Wendung: während hier eine mehrtägige Geburtsarbeit nicht einmal den Kopf auf dem Eingang zu fixiren vermochte, wird die Frucht nach vollbrachter Wendung spontan ausgetrieben. Vielleicht lässt sich auch Fall 4 heranziehen. Es handelt sich daselbst um ein enorm grosses Kind, welches durch ein stark verengtes Becken sehr leicht extrahirt wurde. — Diesen Fällen gegenüber ist Nr. 10 anzuführen: Eine Primipara kann daselbst erst nach Perforation des nachfolgenden Kopfes mit Mühe entbunden werden, während zwei Jahre darauf eine spontane Schädelgeburt einen sehr grossen lebenden Knaben ergiebt.

Diese widersprechenden Resultate tragen also zur Lösung unserer Frage nichts bei, lehren nur, wie jeder einzelne Fall individuell behandelt sein will. Einen Theil derartiger merkwürdiger Beobachtungen will übrigens Martin durch unmerkelt gebliebene Asymmetrie des Beckens erklären.

---

In unserer bisherigen Erörterung haben wir den Ausgang für die Mutter, welcher von den Vorkämpfern der Wendung so sehr betont wird, ausser Acht gelassen. Ist in der That die spontane Geburt mit zögernder Einstellung des Kopfes für die Kreissende mit so grossen Gefahren verknüpft, dass um ihretwillen die Entbindung beschleunigt werden muss? Auch darüber ertheilen die Breslauer Geburtsjournale Auskunft. Abstrahiren wir von vornherein von den schlimmen Folgen der Perforation mit nachfolgender schwieriger Extraction — denn sie treffen ebenso die Geburten mit nachfolgendem Kopfe wie die Kopfgeburten —, so finden wir unter 193 spontanen Geburten mit vorangehendem Kopfe 10 Fälle, die mit tödtlicher Erkrankung der Mutter enden, ausserdem 22 Wochenbettkrankheiten. Sicherlich ist ein grosser Theil davon, wenn ich es auch nicht mit Zahlen belegen kann, nicht der Schwierigkeit der Entbindung zuzuschreiben, manche waren die Folge puerperaler Infection; viele dieser Geburten mit unglücklichem Ausgange sind anscheinend so glücklich verlaufen, als man nur von der Wendung, wenn man für dieselbe begeistert ist, rühmen kann.

Also auch die so sehr urgirte Rücksicht auf die Mutter ist es nicht, welche uns bei jeder Geburtszögerung ohne Weiteres aus der abwartenden Haltung herausnöthigen wird, um vielleicht eines Schreckbildes wegen ein Kindesleben aufs Spiel zu setzen.

Es könnte Jemand auf den Gedanken kommen, uns mit den eigenen Waffen schlagen zu wollen, und verwiese auf die 18 Fälle dieser Sammlung, in denen Erkrankung der Mutter zur Wendung zwang, einigemal ersichtlich mit üblen Folgen im Geburtsverlauf oder Puerperium. Gehen wir die angezogenen Fälle durch, so zeigt sich vorerst, dass nur 11 derselben mit einem vor langer Zeit erfolgten Blasensprung — worauf es doch nur ankommen könnte — zusammentreffen, während 18 andere Fälle von später Operation (durchschnittlich 20 Stunden nach dem Wasserabgang, das Mittel aus 10—48 Stunden) ohne weitere Folgen blieben; ferner zeigt sich, dass von jenen 11 nur 5 mit Wochenbettkrankheiten einhergingen,

während die anderen 6 ein normales Puerperium hinterliessen. Ausserdem möchte ich noch einen anderen Umstand zu bedenken geben: Mit Ausnahme zweier Fälle kamen sämtliche Erkrankungen intra partum in der Poliklinik vor; wie oft wird da nicht der Arzt nur als letzter Nothhelfer zu einer bereits erkrankten Kreissenden gerufen, welche so häufig den widrigsten antihygienischen Einflüssen des Proletariats unterworfen ist? Diese Erwägung, sowie die Beobachtung, dass die beiden in der stationären Klinik während der Entbindung erkrankten Frauen ein normales Puerperium hatten, lassen hoffen, dass der achtsame Geburtshelfer, zur rechten Zeit ans Kreissbett gerufen, schon den geeigneten Moment finden wird, wo eine Veränderung im Allgemeinbefinden der Mutter oder im Zustande des Uterus ihn zum Einschreiten auffordert. —

Die unberechenbare und zum Glück höchst seltene Eventualität einer Uterusruptur wird wohl niemals unser Handeln beeinflussen.

---

Trotz alledem können wir uns den Fall denken, dass die zögernde Einstellung des Kopfes durch ein Moment begründet wird, welches die Gefahr für Mutter und Kind in greifbare Nähe führt, und wo Abwarten nach menschlicher Berechnung vom Uebel wäre. In der That gibt es einen solchen Fall, und wir begegnen ihm sehr oft auch in dieser Sammlung von Wendungsfällen. Ich meine die abnorme Deviation des Kopfes nach der vorderen oder hinteren Beckenwand zu, die sogenannte vordere und hintere Scheitelbeinlage. Letztere, durch eine hohe, steile, vordere Beckenwand und ein tiefstehendes Promontorium, besonders bei hochgradig in der Conjugata verengten Becken verursacht, ist nicht nur eine für den Fortschritt der Geburt höchst hinderliche Kopfstellung, sondern ausserdem mit drohenden deletären Folgen für die Mutter verknüpft. Während das flachaufliegende hintere Scheitelbein tiefer ins Becken rückt, vermag die vordere Partie, von der steilen Symphyse zurückgehalten, nicht zu folgen. Um nachzurücken, was ohnehin selten geschehen mag, müsste das vordere Scheitelbein sich mit zermalmender Kraft zum Schaden des Kindes, zum Unheil der Mutter herabwälzen.

Hier wird es gebieterische Pflicht, mit den Mitteln der Kunst einzuschreiten, und das beste Mittel, um eine ungünstige Lage zu ändern, ist, wenn sonst die Bedingungen erfüllt sind, die Wendung, aber nur bei Ausschluss allgemeiner Beckenenge. — Nicht so gefährlich, immerhin bedenklich, ist die vordere Scheitelbeinlage, wo ein hochstehendes Promontorium bei flacher vorderer Beckenwand den Kopf, in einem nach hinten offenen Winkel gegen den Rumpf geknickt, zurückhält, so dass der untersuchende Finger das vordere Scheitelbein flach dem Becken aufliegend fühlt und vor der Schamfuge ein Ohr erreicht. Aus der Uebertreibung einer für die anfängliche Schädeleinstellung beim platten Becken fast physiologischen Erscheinung, der Naegle'schen Obliquität hervorgegangen, bietet sie immer mehr Chancen, dass der Kopf an der abschüssigen hinteren Beckenwand herabgleiten und so die Enge überwinden werde. Bei längerem Verharren in dieser Stellung wird es auch hier nothwendig, um den continuirlichen partiellen Druck zu beseitigen und die Geburt in Gang zu bringen, die Wendung vorzunehmen. In der Würdigung dieser Verhältnisse waren es zumeist diese Stellungen, welche die uncomplicirten Wendungen indicirten, zum grössten Theil wurden daher letztere bei stehender Blase oder nicht lange nach dem Wasserabgange ausgeführt. Dieselben Becken übrigens, welche die Deviation des Kopfes nach vorn begünstigen, disponiren dazu, dem Schädel die Spuren des zurückgelegten Weges nicht nur dem Vorberg, sondern auch der Schamfuge entsprechend in Form von Impressionen und Infraktionen aufzuprägen. (Vgl. Nr. 6, 13).

Einer Erörterung bedürftig sind noch zwei Indicationen, welche Schröder in seinem Lehrbuche der Geburtshülfe aufstellt. Gestützt auf seine glückliche Wendungspraxis, überzeugt von der Allgemeingültigkeit seiner Erfahrung, hält er es für höchst rationell, bei Gesichts-, Stirnlagen, Vorfall kleiner Theile, besonders der Nabelschnur, ohne Weiteres zu wenden. Dem entgegen weist bei engem Becken die Breslauer Praxis 8 Fälle auf, wo nach Reposition der Nabelschnur die Kinder spontan lebend zur Welt kamen; ferner einen

Fall, wo der Kopf bereits in der Beckenhöhle stand, weder Reposition noch Wendung möglich war, und die Frucht mit der Zange lebend extrahirt wurde; nur einmal starb die Frucht nach gelungener Reposition vor der übrigens spontanen Austreibung. Ferner wurde dreimal mit Glück die vorgefallene Hand reponirt. —

Ebensowenig stichhaltig ist die von der Gesichtslage hergenommene Indication. Es kamen in Breslau vor:

Bei platten Becken Cv. 3" 4—6": 3 Gesichtslagen, spontan, lebend; Cv. 3"—3" 3": 10 Gesichtslagen, davon 6 spontan, lebend, 1 spontan, sterbend, 1 mittelst Zange lebend, zweimal Perforation; ferner 3 Stirnlagen, davon 1 mittelst Zange, lebend, 2 mittelst Perforation. Bei plattem allgemein verengtem Becken Cv. 3"—3" 3": 2 Gesichtslagen, beide spontan, todt.

Die Wendung wurde in 7 Fällen wegen dringender Indication vorgenommen, 5 mal mit unglücklichem Erfolge.

Nachdem wir die Grenzen der Wendung gegen die expectative Behandlung hin festgestellt haben, bleibt uns noch übrig, die Alternative von Wendung und Zange zu besprechen.

Hätten sich die Grundsätze über die Vorbedingungen der Zangenapplication, wie sie schon Stein d. J. aufstellte, wie sie Prof. Spiegelberg seit Jahren so eindringlich lehrt, Schroeder in seinem Handbuche der Geburtshülfe so überzeugend auseinandersetzt, allgemeine Geltung verschafft, dann wäre eine solche Collision von Zange und Wendung nicht möglich. So lange aber noch in manchen Handbüchern das enge Becken als besonders die Anlegung der Zange indicirend hingestellt wird, so lange man einen Kopf zangengerecht nennt, der noch über der Enge stehend sich immerhin von den Zangenblättern fassen lässt, so lange kann nicht genug auf das Gefährliche dieses Grundsatzes hingewiesen werden. Was sich dagegen durch einen zweckmässigen Gebrauch der Zange bei engem Becken, nämlich wenn der Kopf die Enge überwunden hat oder wenigstens fest in der Beckenhöhle steht, erreichen lässt, lehrt uns ein Hinblick auf die obige Tabelle: 50 Extraktionen mit der Zange, 36 Kinder

lebend, 14 todt; von letzteren waren 3 vorher abgestorben, der grösste Theil wegen Verlangsamung des Fötalpulses extrahirt.

Welches sind wohl die Resultate der hochangelegten Zange?

Bei der Besprechung der Wendungserfolge habe ich die Resultate der Geburten in Beckenendenlage nicht mit denen der Wendung und Extraction identificirt. Es erschien mir dies unthunlich, weil sich die Beckenendenlagen in Bezug auf den Geburtsverlauf und Ausgang eines Vortheils erfreuen. Ursachen liessen sich mehrere finden. Einmal fehlt bei letzteren meist das erschwerende Moment der Extraction des Rumpfes, welche zu ungünstigen Drehungen, zum Heraufschlagen der Arme, zur Entfernung des Kinnes von der Brust disponirt. Es fehlt ferner die Misshandlung und irritirende Manipulation im Uterus, wie sie bisweilen bei der Wendung stattfindet und welche zur Folge hat, dass sich das Kind häufig asphyctisch zur Extraction einstellt oder wegen Stricture des Muttermundes nicht schnell genug entwickeln lässt.

Ferner mag auch in den vorliegenden Fällen die häufige Einstellung mit dem Steisse oder in unvollkommener Fusslage im Verein mit dem die Eröffnungsperiode verzögernden Moment der Beckenenge dem leichteren Durchtritt des Kopfes zu statten kommen.

Im Hinblick auf die hier veröffentlichten Resultate und die daran geknüpften Betrachtungen ist es klar, welche Stellung die Breslauer Schule zu den beiden Eingangs erwähnten entgegengesetzten Anschauungen einnimmt. Nach der einen Seite hin, das Gewicht der Gründe, welche die unbedingten Gegner der Wendung aufstellen, verstärkend, nähern wir uns anderseits den Anhängern der prophylactischen Wendung, indem wir dieselbe, aber nur bei gradverengtem Becken, für geboten erachten, sobald die Ursache der mangelnden Einstellung des Kopfes in der genau erörterten relativ falschen Lage desselben zu suchen ist.

## Lebenslauf.

---

Verfasser, geboren am 15. März 1848 zu Sohrau Ober-Schlesien, jüdischer Confession, Sohn des Kaufmanns Adolph Borinski, besuchte vom Jahre 1861 bis zum Jahre 1867 das Gymnasium in Gleiwitz, von wo er August 1867 mit dem Zeugniss der Reife entlassen wurde. Im October desselben Jahres liess er sich bei der medicinischen Facultät der Universität Breslau immatriculiren und studirte daselbst durch neun Semester mit elfmonatlicher Unterbrechung durch Einziehung zum Heere.

Während seines Studiums besuchte er die Vorlesungen und practischen Uebungen folgender Herren Professoren und Privatdocenten:

Barkow, F. Cohn, H. Cohn, Ebstein, Fischer, Foerster, Grosser, Grube, Haeser, Heidenhain, Lebert, Loewig, Maas, Marbach, Meyer, Schmid, Spiegelberg, Voltolini, Waldeyer.

Allen diesen Herrn sagt er seinen wärmsten Dank.



## Thesen.

---

- I. Bei Incarceration einer Hernie sind lange fortgesetzte Repositionsversuche zu widerrathen.
- II. So lange neben einer Anteflexio uteri kein sonstiges locales Leiden besteht, ist an einen Causalnexus zwischen ersterer und einer gleichzeitig vorhandenen Allgemeinstörung nicht zu denken.
- III. Linsenmangel schliesst nicht absolut die Möglichkeit der Accomodation aus.